

Bipacksedel: Information till patienten

Perampanel Orion 2 mg filmdragerade tabletter
Perampanel Orion 4 mg filmdragerade tabletter
Perampanel Orion 6 mg filmdragerade tabletter
Perampanel Orion 8 mg filmdragerade tabletter
Perampanel Orion 10 mg filmdragerade tabletter
Perampanel Orion 12 mg filmdragerade tabletter

perampanel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Perampanel Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Perampanel Orion
3. Hur du tar Perampanel Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Perampanel Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Perampanel Orion är och vad det används för

Perampanel Orion innehåller läkemedlet perampanel. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas antiepileptika. Dessa läkemedel används för att behandla epilepsi, d.v.s. tillstånd då någon har upprepade kramper (anfall). Det har ordinerats till dig av din läkare för att minska antalet krampanfall.

Perampanel Orion används tillsammans med andra läkemedel mot epilepsi för att behandla vissa former av epilepsi:

Hos vuxna, ungdomar (i åldern 12 år och äldre) och barn (från 4 till 11 år)

- det används för att behandla krampanfall som påverkar en del av hjärnan (ett "partiellt anfall").
- dessa partiella anfall kan, men behöver inte, följas av anfall som påverkar hela hjärnan (en "sekundär generalisering").

Hos vuxna, ungdomar (i åldern 12 år och äldre) och barn (från 7 till 11 år)

- det används också för att behandla vissa anfall som påverkar hela hjärnan från början (kallas "generaliserade anfall") och orsakar kramper eller frånvaroattacker.

Perampanel som finns i Perampanel Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Perampanel Orion

TA INTE Perampanel Orion:

- om du någonsin fått allvarliga hudutslag eller flagnande hud, blåsor och/eller munsår efter att du tagit perampanel.

- om du är allergisk mot perampanel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Perampanel Orion om du har leverproblem eller måttliga eller svåra njurproblem.

Ta inte Perampanel Orion om du har svåra leverproblem eller måttliga eller svåra njurproblem.

Innan du tar det här läkemedlet ska du tala om för läkaren om du tidigare har varit alkohol- eller drogberoende.

Fall av ökade nivåer av leverenzymmer har rapporterats hos vissa patienter som använder Perampanel Orion i kombination med andra antiepileptiska läkemedel.

- Perampanel Orion kan få dig att känna dig yr eller sömnig, särskilt i början av behandlingen.
- Perampanel Orion kan göra dig mer benägen att falla, särskilt om du är äldre, vilket också kan bero på din sjukdom.
- Perampanel Orion kan göra dig aggressiv, arg eller våldsam. Det kan också göra att du får ovanliga eller extrema förändringar av ditt beteende eller humör, onormalt tänkande och/eller förlorad kontakt med verkligheten.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du eller din familj och/eller vänner märker någon av dessa reaktioner.

Själv mordstankar och tankar på att skada sig själv har rapporterats hos ett litet antal patienter som behandlas med antiepileptika. Kontakta omedelbart din läkare om du någon gång får sådana tankar.

Allvarliga hudreaktioner inklusive läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) och Stevens-Johnsons syndrom (SJS) har rapporterats vid användning av perampanel.

- DRESS uppträder oftast, men inte endast, som influensaliknande symtom och utslag med kroppstemperatur över det normala, förhöjda leverenzymnivåer i blodprov och förhöjt antal av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) samt förstörade lymfknutor.
- Stevens-Johnsons syndrom (SJS) kan initialt framträda som rödaktiga fläckar med ”målavlautseende” eller cirkelformade utslag på bålén, ofta med blåsor i mitten. Dessutom kan sår förekomma på mun, hals, näsa, könsorgan och ögon (röda och svullna ögon). Dessa allvarliga hudutslag föregås ofta av feber och/eller influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till omfattande bortfall av huden och livshotande komplikationer eller vara dödliga.

Om du upplever något av ovanstående efter att ha tagit Perampanel Orion (eller om du inte är säker) ska du tala med läkare eller apotekspersonal.

Barn

Perampanel Orion rekommenderas inte för barn under 4 år. Säkerhet och effekt är ännu inte kända hos barn under 4 år för partiella anfall och under 7 år för generaliserade anfall.

Andra läkemedel och Perampanel Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta innefattar även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Perampanel Orion i kombination med andra läkemedel kan orsaka biverkningar eller påverka hur läkemedlen verkar.

Påbörja eller avsluta inte andra läkemedelsbehandlingar utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

- andra läkemedel mot epilepsi, t.ex. karbamazepin, oxkarbazepin och fenytoin som används för att behandla krampanfall kan påverka Perampanel Orion. Tala om för läkaren om du tar eller nyligen har tagit dessa läkemedel eftersom din dos kan behöva justeras.
- även felbamat (ett läkemedel som används för att behandla epilepsi) kan påverka Perampanel Orion. Tala om för läkaren om du tar eller nyligen har tagit detta läkemedel eftersom din dos kan behöva justeras.
- midazolam (ett läkemedel som används för att stoppa utdragna, akuta (plötsliga) krampanfall, som lugnande och för sömnbesvär) kan påverkas av Perampanel Orion. Tala om för läkaren om du tar midazolam eftersom din dos kan behöva justeras.
- vissa andra läkemedel som rifampicin (ett läkemedel mot bakteriella infektioner), *Hypericum* (johannesört) (ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel mot lindrig oro) och ketokonazol (ett

läkemedel mot svampinfektioner) kan påverka Perampanel Orion. Tala om för läkaren om du tar eller nyligen har tagit dessa läkemedel eftersom din dos kan behöva justeras.

- hormonella preventivmedel (inklusive orala preventivmedel, implantat, injektioner och plåster). Tala om för din läkare om du tar hormonella preventivmedel. Perampanel Orion kan göra vissa hormonella preventivmedel, såsom levonorgestrel, mindre effektiva. Du bör använda andra typer av säkra och effektiva preventivmedel (såsom kondom eller spiral) när du tar Perampanel Orion. Du bör fortsätta att göra detta under en månad efter att behandlingen har avslutats. Diskutera med din läkare vilka preventivmedel som är bäst för dig.

Perampanel Orion med alkohol

Tala med din läkare innan du dricker alkohol. Var försiktig med alkoholkonsumtionen när du tar antiepileptiska läkemedel som Perampanel Orion.

- Dricker du alkohol samtidigt som du tar Perampanel Orion kan det göra dig mindre uppmärksam och påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg och maskiner.
- Alkohol tillsammans med Perampanel Orion kan även förvärra känslor av ilska, förvirring och sorgsenhet.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Avsluta inte behandlingen utan att först ha talat med din läkare.

- Perampanel Orion rekommenderas inte vid graviditet.
- Du måste använda pålitliga preventivmedel för att undvika att bli gravid under tiden du behandlas med Perampanel Orion. Du bör fortsätta att göra detta under en månad efter att behandlingen har avslutats. Tala om för läkaren om du tar hormonella preventivmedel. Perampanel Orion kan göra vissa hormonella preventivmedel, t.ex. levonorgestrel, mindre effektiva. Du bör använda andra typer av säkra och effektiva preventivmedel (t.ex. kondom eller spiral) när du tar Perampanel Orion. Du bör fortsätta att göra detta under en månad efter att behandlingen har avslutats. Diskutera med din läkare vilka preventivmedel som är bäst för dig.

Det finns ingen information om huruvida Perampanel Orions innehållsämnen kan överföras till bröstmjölk. Läkaren bedömer de fördelar och risker som behandling med Perampanel Orion i kombination med amning innebär för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inga maskiner förrän du vet hur Perampanel Orion påverkar dig.

Du måste tala med din läkare om vilken effekt din epilepsi har på bilkörning och användning av maskiner.

- Perampanel Orion kan få dig att känna dig yr eller sömnig, särskilt i början av behandlingen. Om det händer dig ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller maskiner.
- Om du dricker alkohol samtidigt som du tar Perampanel Orion kan dessa effekter förstärkas.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Perampanel Orion innehåller laktos

Perampanel Orion innehåller laktos (som monohydrat), 73,6 mg (2 mg tabletter), 147,3 mg (4 mg tabletter), 145,4 mg (6 mg tabletter), 143,5 mg (8 mg tabletter), 141,6 mg (10 mg tabletter) och 139,7 mg (12 mg tabletter). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Perampanel Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket läkemedel som ska tas

Perampanel Orion tabletter är inte lämpliga att använda vid behandlingsstart och upptrappning till patienter som väger mindre än 30 kg. De kan även vara olämpliga för underhållsbehandling till dessa patienter.

Vuxna och ungdomar (i åldern 12 år och äldre) vid behandling av partiella anfall och generaliserade anfall:

Startdosen är vanligtvis 2 mg en gång per dag före sänggående.

- Din läkare kan öka dosen med 2 mg i taget upp till en underhållsdos på mellan 4 mg och 12 mg beroende på hur du svarar på ökningen.
- Om du har lindriga eller måttliga leverproblem ska du inte ta en högre dos än 8 mg per dag och dina dosökningar ska göras med minst två veckors mellanrum.
- Ta inte högre dos av Perampanel Orion än vad din läkare har ordinerat. Det kan ta några veckor att hitta rätt dos av Perampanel Orion för dig.

I nedanstående tabell sammanfattas de rekommenderade doserna vid behandling av partiella anfall hos barn mellan 4 och 11 år och generaliserade anfall hos barn mellan 7 och 11 år. Mer information finns under tabellen.

	Barn som väger:		
	Mer än 30 kg	20 kg till mindre än 30 kg	Mindre än 20 kg
Rekommenderad startdos	2 mg/dag	1 mg/dag	1 mg/dag
Rekommenderad underhållsdos	4–8 mg/dag	4–6 mg/dag	2–4 mg/dag
Rekommenderad maximal dos	12 mg/dag	8 mg/dag	6 mg/dag

Barn (från 4 till 11 år) som väger 30 kg eller mer vid behandling av partiella anfall:

Startdosen är vanligtvis 2 mg en gång om dagen före sänggående.

- Din läkare kan öka dosen med 2 mg i taget upp till en underhållsdos på mellan 4 mg och 8 mg beroende på hur du svarar på behandlingen. Beroende på det individuella behandlingssvaret och hur väl du tål läkemedlet kan dosen ökas till en maximal dos på 12 mg/dag.
- Om du har lindriga eller måttliga leverproblem ska du inte ta en högre dos än 4 mg per dag och dina dosökningar ska göras med minst två veckors mellanrum.
- Ta inte högre dos av Perampanel Orion än vad din läkare har ordinerat. Det kan ta några veckor att hitta rätt dos av Perampanel Orion för dig.

Barn (från 4 till 11 år) som väger 20 kg till mindre än 30 kg vid behandling av partiella anfall:

Startdosen är vanligtvis 1 mg en gång om dagen före sänggående.

- Din läkare kan öka dosen med 1 mg i taget upp till en underhållsdos på mellan 4 mg och 6 mg beroende på hur du svarar på behandlingen. Beroende på det individuella behandlingssvaret och hur väl du tål läkemedlet kan dosen ökas till en maximal dos på 8 mg/dag.
- Om du har lindriga eller måttliga leverproblem ska du inte ta en högre dos än 4 mg per dag och dina dosökningar ska göras med minst två veckors mellanrum.
- Ta inte högre dos av Perampanel Orion än vad din läkare har ordinerat. Det kan ta några veckor att hitta rätt dos av Perampanel Orion för dig.

Barn (från 4 till 11 år) som väger mindre än 20 kg vid behandling av partiella anfall:

Startdosen är vanligtvis 1 mg en gång om dagen före sänggående.

- Din läkare kan öka dosen med 1 mg i taget upp till en underhållsdos på mellan 2 mg och 4 mg beroende på hur du svarar på behandlingen. Beroende på det individuella behandlingssvaret och hur väl du tål läkemedlet kan dosen ökas till en maximal dos på 6 mg/dag.
- Om du har lindriga eller måttliga leverproblem ska du inte ta en högre dos än 4 mg per dag och dina dosökningar ska göras med minst två veckors mellanrum.
- Ta inte högre dos av Perampanel Orion än vad din läkare har ordinerat. Det kan ta några veckor att hitta rätt dos av Perampanel Orion för dig.

Barn (från 7 till 11 år) som väger 30 kg eller mer vid behandling av generaliserade anfall:

Startdosen är vanligtvis 2 mg en gång om dagen före sänggående.

- Din läkare kan öka dosen med 2 mg i taget upp till en underhållsdos på mellan 4 mg och 8 mg beroende på hur du svarar på behandlingen. Beroende på det individuella behandlingssvaret och hur väl du tål läkemedlet kan dosen ökas till en maximal dos på 12 mg/dag.
- Om du har lindriga eller måttliga leverproblem ska du inte ta en högre dos än 4 mg per dag och dina dosökningar ska göras med minst två veckors mellanrum.
- Ta inte högre dos av Perampanel Orion än vad din läkare har ordinerat. Det kan ta några veckor att hitta rätt dos av Perampanel Orion för dig.

Barn (från 7 till 11 år) som väger 20 kg till mindre än 30 kg vid behandling av generaliserade anfall:

Startdosen är vanligtvis 1 mg en gång om dagen före sänggående.

- Din läkare kan öka dosen med 1 mg i taget upp till en underhållsdos på mellan 4 mg och 6 mg beroende på hur du svarar på behandlingen. Beroende på det individuella behandlingssvaret och hur väl du tål läkemedlet kan dosen ökas till en maximal dos på 8 mg/dag.
- Om du har lindriga eller måttliga leverproblem ska du inte ta en högre dos än 4 mg per dag och dina dosökningar ska göras med minst två veckors mellanrum.
- Ta inte högre dos av Perampanel Orion än vad din läkare har ordinerat. Det kan ta några veckor att hitta rätt dos av Perampanel Orion för dig.

Barn (från 7 till 11 år) som väger mindre än 20 kg vid behandling av generaliserade anfall:

Startdosen är vanligtvis 1 mg en gång om dagen före sänggående.

- Din läkare kan öka dosen med 1 mg i taget upp till en underhållsdos på mellan 2 mg och 4 mg beroende på hur du svarar på behandlingen. Beroende på det individuella behandlingssvaret och hur väl du tål läkemedlet kan dosen ökas till en maximal dos på 6 mg/dag.
- Om du har lindriga eller måttliga leverproblem ska du inte ta en högre dos än 4 mg per dag och dina dosökningar ska göras med minst två veckors mellanrum.
- Ta inte högre dos av Perampanel Orion än vad din läkare har ordinerat. Det kan ta några veckor att hitta rätt dos av Perampanel Orion för dig.

Hur du tar Perampanel Orion

Svälj tabletten hel med ett glas vatten. Du kan ta Perampanel Orion med eller utan mat. Tabletten ska inte tuggas, krossas eller delas. Tabletterna går inte att dela exakt eftersom de saknar brytskåra.

Om du har tagit för stor mängd av Perampanel Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan bli förvirrad, orolig, aggressiv eller drabbas av kräkningar och sänkt medvetandegrad.

Om du har glömt att ta Perampanel Orion

- Om du har glömt att ta en dos ska du vänta tills det är dags för nästa dos och därefter fortsätta som vanligt.
- Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
- Om du har missat färre än sju dagars behandling med Perampanel Orion fortsätter du att ta din dagliga dos så som din läkare har ordinerat.
- Om du har missat fler än sju dagars behandling med Perampanel Orion ska du omedelbart tala med din läkare.

Om du slutar att ta Perampanel Orion

Ta Perampanel Orion så länge som din läkare ordinerar. Sluta inte att ta läkemedlet såvida inte din läkare råder dig till det. Din läkare kan minska din dos långsamt för att undvika att dina kramper (anfall) kommer tillbaka eller förvärras. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Själv mordstankar och tankar på att skada sig själv har rapporterats hos ett litet antal patienter som behandlas med antiepileptika. Kontakta omedelbart din läkare om du någon gång får sådana tankar.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- yrsel
- sömnhet (dåsighet eller mycket stort sömnbehov).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- ökad eller minskad aptit, viktuppgång
- aggressivitet, argsinhet, retlighet, ångest eller förvirring
- svårigheter att gå eller andra balansproblem (ataxi, gångstörning, balansrubbnig)
- långsamt tal (dysartri)
- dimsyn eller dubbelseende (diplopi)
- en snurrande känsla (vertigo)
- illamående
- ryggont
- känsla av att vara mycket trött
- fall.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- tankar om att skada sig själv eller avsluta sitt liv (själv mordstankar), försök att avsluta sitt liv (själv mordsförsök)
- hallucinationer (ser, hör eller känner saker som inte finns där)
- onormalt tänkande och/eller förlorad kontakt med verkligheten (psykotiska störningar).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- Läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom, även kallat DRESS eller överkänslighetsreaktion vid läkemedelsbehandling: utbredda utslag, kroppstemperatur över det normala, förhöjd nivå av leverenzym, blodavvikelse (eosinofili), förstörade lymfknotor och annat organengagemang.
- Stevens-Johnsons syndrom (SJS). Dessa allvarliga hudutslag kan framträda som rödaktiga, fläckar med "målta-utseende" eller cirkelformade utslag på bålen, ofta med blåsor i mitten, bortfallande hud och sår på mun, hals, näsa, könsorgan och ögon samt föregås av feber och influensaliknande symtom.

Sluta använda perampanel om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök vård omedelbart. Se även avsnitt 2.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Perampanel Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret eller kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är perampanel. Varje filmdragerad tablett innehåller 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg, 10 mg eller 12 mg perampanel (som $\frac{3}{4}$ hydrat).
- Övriga innehållsämnen är:
 - Tablettkärna: laktosmonohydrat, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, povidon, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat.
 - Filmdragring: hypromellos, talk, makrogol 8000, titandioxid (E171) och färgämnen*.

*Färgämnena är:

2 mg: gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172)

4 mg: röd järnoxid (E172)

6 mg: röd järnoxid (E172)

8 mg: röd järnoxid, svart järnoxid (E172)

10 mg: indigokarmin aluminiumlack (E132), gul järnoxid (E172)

12 mg: indigokarmin aluminiumlack (E132)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2 mg: Orange, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, 7 mm i diameter, präglade med "L1" på ena sidan och släta på andra sidan.

4 mg: Röda, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, 8 mm i diameter, präglade med "L2" på ena sidan och släta på andra sidan.

6 mg: Rosa, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, 8 mm i diameter, präglade med "L3" på ena sidan och släta på andra sidan.

8 mg: Lila, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, 8 mm i diameter, präglade med "L4" på ena sidan och släta på andra sidan.

10 mg: Gröna, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, 8 mm i diameter, präglade med "L5" på ena sidan och släta på andra sidan.

12 mg: Blå, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter, 8 mm i diameter, präglade med "L6" på ena sidan och släta på andra sidan.

Förpackningsstorlekar: PVC/Aluminium-blister med 7, 28, 84, 98 filmdragerade tabletter.
HDPE-burk om 30 filmdragerade tabletter med barnskyddande förslutning (polypropenlock med vitt, ogenomskinligt ytterlock, genomskinligt innerlock och insats).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:
Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2026-07-06