

Bipacksedel: Information till patienten

Petidin Viatris 50 mg/ml injektionsvätska, lösning petidin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Petidin Viatris är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Petidin Viatris
3. Hur du använder Petidin Viatris
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Petidin Viatris ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Petidin Viatris är och vad det används för

Petidin Viatris innehåller den aktiva substansen petidin, som petidinhydroklorid, och hör till en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider.

Petidin Viatris används vid svåra smärttillstånd.

Petidin som finns i Petidin Viatris kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Petidin Viatris

Använd inte Petidin Viatris:

- om du är allergisk mot petidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna
- vid nedsatt andningsfunktion
- vid orostillstånd hos patienter som är påverkade av alkohol eller sömnmedel
- vid samtidig behandling med MAO-hämmare (medel mot depression).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Petidin Viatris

- vid astma
- vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
- vid skallskada
- vid förhöjt skalltryck
- vid lågt blodtryck med minskad blodvolym
- vid nedsatt lever- eller njurfunktion
- vid epilepsi och hjärtrytmrubbningar.

Detta läkemedel innehåller petidin som är en opioid. Det kan leda till beroende och/eller missbruk.

Upprepad användning av opioider kan leda till att läkemedlet blir mindre effektivt (man vänjer sig vid det, något som kallas tolerans). Upprepad användning av Petidin Viatris kan också leda till beroende och missbruk med risk för livshotande överdosering. Risken för dessa biverkningar kan öka med högre dos och långvarig användning.

Beroende eller missbruk kan få dig att känna att du inte längre har kontroll över hur mycket läkemedel du behöver ta eller hur ofta du behöver ta det.

Risken för beroende eller missbruk varierar från person till person. Du kan löpa större risk för beroende eller missbruk av Petidin Viatris om:

- Du eller någon i din familj någon gång har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller olagliga droger ("missbruk").
- Du röker.
- Du någon gång haft problem med sinnesstämningen (till exempel depression, ångest eller en personlighetsstörning) eller har behandlats av en psykiater för annan psykisk sjukdom.

Om du märker något av följande tecken medan du använder Petidin Viatris kan det vara ett tecken på att du har blivit beroende:

- Du behöver ta läkemedlet under en längre tid än vad läkaren har ordinerat.
- Du behöver ta mer än den rekommenderade dosen.
- Du kanske känner att du måste fortsätta ta ditt läkemedel, även om det inte lindrar smärtan.
- Du använder läkemedlet för andra skäl än de ordinerade, till exempel för att "känna dig lugn" eller för att få "hjälp att sova".
- Du har gjort upprepade, misslyckade försök att sluta eller få kontroll över läkemedelsanvändningen.
- När du slutar att ta läkemedlet kan du känna dig sjuk och mår bättre när du använder läkemedlet igen ("utsättningssymtom").

Om du märker något av dessa tecken ska du tala med läkare för att diskutera den bästa behandlingsvägen för dig, samt när det är lämpligt att sluta och hur du gör det på ett säkert sätt.

Sömnelaterade andningsstörningar

Petidin Viatris kan orsaka andningsstörningar när du sover, såsom sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) och sömnelaterad hypoxemi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningsuppehåll under sömnen, uppvaknanden nattetid på grund av andnöd, svårigheter att upprätthålla sömnen eller uttalad dåsighet under dagen. Kontakta läkaren om du eller någon annan märker dessa symtom. Läkaren kan överväga att sänka dosen.

Tala med din läkare om du upplever något av följande symtom när du använder Petidin Viatris

- Om du känner smärta eller blir mer känslig för smärta (hyperalgesi) och det inte hjälper med högre doser läkemedel.
- Om du får svår smärta i övre delen av magen som eventuellt strålar ut i ryggen, illamående, kräkningar eller feber, eftersom detta kan vara symtom förknippade med inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) eller gallvägarna.

Andra läkemedel och Petidin Viatris

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidig användning av Petidin Viatris och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

- andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)
- lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater)
- narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

- vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)
- muskelavslappnande läkemedel
- gabapentin eller pregabalin (läkemedel som används för behandling av epilepsi, nervsmärta eller ångest)

På grund av detta ska samtidig användning av Petidin Viatris och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Petidin Viatris samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.

Effekten av behandlingen kan även påverkas om Petidin Viatris tas samtidigt som vissa andra läkemedel. Följande kombinationer med Petidin Viatris bör undvikas:

- läkemedel mot depression (MAO-hämmare) (moklobemid, selegilin),
- läkemedel mot epilepsi (karbamazepin),
- kramphämmande läkemedel (fenytoin),
- läkemedel mot HIV (ritonavir),
- serotonerga läkemedel, inklusive selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI, såsom paroxetin, fluoxetin, citalopram, escitalopram, sertralin, fluvoxamin), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI, såsom venlafaxin, duloxetin) och läkemedel som innehåller johannesört (Hyper perforatum), eftersom en interaktion inte kan uteslutas.

Tala med din läkare om du har tagit eller tar något av följande:

- läkemedel för att behandla depression
- läkemedel som används för att behandla allergier, åksjuka eller illamående (antihistaminer eller antiemetika)
- läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar (antipsykotika eller neuroleptika)
- muskelavslappnande läkemedel
- läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom.

Petidin Viatris och alkohol

Alkohol ska inte användas under behandling med Petidin Viatris, eftersom kombinationen kan orsaka t.ex. försämrad andningsfunktion (andningsdepression).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av petidin under förlossningen kan göra att det nyfödda barnet får nedsatt andningsfunktion. Om Petidin Viatris används under lång tid under graviditeten kan det hända att det nyfödda barnet får abstinenssymtom.

Petidin passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före användning av Petidin Viatris under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Petidin Viatris kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner eftersom den kan ge biverkningar som yrsel, dåsighet och nedsatt reaktionsförmåga. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Petidin Viatris

Läkemedlet ges av en läkare eller sjuksköterska. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller är osäker.

Innan du påbörjar behandlingen och regelbundet under behandlingen kommer läkaren att diskutera med dig om vad du kan förvänta dig av användningen av Petidin Viatris, när och hur länge du behöver ta det, när du ska kontakta din läkare och när du behöver sluta med behandlingen.

Petidin Viatris ska användas under kortaste möjliga tid som behövs för att lindra symtomen. Rådfråga en läkare om du inte får någon effektiv smärtlindring när du använder läkemedlet.

Om du använt för stor mängd av Petidin Viatris

Sannolikheten att du får för stor mängd utav Petidin Viatris är liten då du ges denna av läkare eller annan sjukhuspersonal. Symtom som man kan få är t.ex. yrsel, muskelryckningar, kramper., illamående och uppgjagad sinnesstämning. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Flera av biverkningarna är dosberoende och som för alla opioider finns det risk för beroende med Petidin Viatris.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- Illamående,
- kräkningar,
- muntorrhet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Eufori (lyckokänsla),
- yrsel,
- nedsatt andningsfunktion,
- dåsighet,
- svimningsanfall,
- lågt blodtryck,
- hjärklappning,
- förstoppning,
- kramp i gallgångarna,
- nässelfeber,
- hudrodnad,
- svårighet att kissa.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

- kramper,
- muskelryckningar,
- darrningar,
- läkemedelsberoende.

Du kan bli beroende av Petidin Viatris (se avsnitt 2 Varningar och försiktighet för mer information).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Petidin Viatris ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är petidin i form av petidinhydroklorid.
- Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glasampuller 10x1 ml

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB
Box 23033
104 35 Stockholm

Tillverkare

Unimedic AB
Box 91
864 21 Matfors

Denna bipacksedel ändrades senast: 2026-06-16