

Bipacksedel: Information till användaren

Propranolol Ebb 10 mg filmdragerade tabletter propranololhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Propranolol Ebb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Propranolol Ebb
3. Hur du använder Propranolol Ebb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Propranolol Ebb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Propranolol Ebb är och vad det används för

Propranolol Ebb innehåller propranololhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Det har effekter på hjärtat och blodcirkulationen men också på andra delar av kroppen.

Propranolol Ebb kan användas för:

- Hypertoni (högt blodtryck)
- Kärlkramp (bröstsmärta)
- Vissa arytmier (störningar av hjärtrytmen)
- Skydd av hjärtat efter en hjärtinfarkt (hjärtattack)
- Migrän
- Essentiell tremor (ofrivilligt och rytmiskt skakande)
- Vissa sköldkörtelsjukdomar (tyreotoxikos och hypertyreos, som orsakas av en överaktiv sköldkörtel)
- Hypertrofisk kardiomyopati (förtjockad hjärtmuskel)
- Feokromocytom (högt blodtryck på grund av en tumör som vanligtvis sitter nära njurarna)
- Blödning i matstruben orsakat av högt blodtryck i levern

Propranololhydroklorid som finns i Propranolol Ebb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Propranolol Ebb

Använd inte Propranolol Ebb om du:

- är allergisk mot propranololhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- har hjärtsvikt som inte behandlas eller kontrolleras
- har haft en chock som orsakas av hjärtproblem
- har allvarliga hjärtdefekter (hjärtblock av andra eller tredje graden), ett tillstånd som eventuellt behandlas med pacemaker
- har problem med hjärtöverledning eller hjärtrytm

- har mycket långsam eller mycket ojämn hjärtfrekvens
- har ökad surhetsgrad i blodet (metabol acidosis)
- följer en sträng fastekost
- har astma, pippljud eller andra andningssvårigheter
- har ett obehandlat feokromocytom (högt blodtryck på grund av en tumör nära njuren)
- har svåra blodcirkulationsproblem (som kan få fingrarna att pirra eller bli bleka eller blåfärgade)
- har en trängande smärtekänsla i bröstet vid vila (Prinzmetals angina)
- har mycket lågt blodtryck

Om du tror att något av ovanstående gäller dig, eller om du är tveksam, prata med läkaren innan du börjar använda Propranolol Ebb.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Propranolol Ebb om du:

- får allergiska reaktioner av sådant som insektsbett.
- har diabetes eftersom Propranolol Ebb kan ändra ditt normala svar på lågt blodsocker, som vanligtvis omfattar en ökning av hjärtfrekvens. Propranolol Ebb kan orsaka låga blodsockernivåer även hos patienter som inte har diabetes.
- har tyreotoxikos. Propranolol Ebb kan dölja symtomen på tyreotoxikos.
- har njur- eller leverproblem (inklusive skrumplever). Om du har detta, tala med läkaren eftersom du kan behöva gå på kontroller under behandlingen.
- har hjärtproblem.
- lider av muskelsvaghet (myastenia gravis).
- har tillstånd som kroniskt obstruktiv lungsjukdom och kramp i luftrören (bronkospasm), eftersom användning av Propranolol Ebb kan försämra dessa tillstånd.
- använder kalciumkanalblockerare som ger en minskning av hjärtats slagkraft, såsom verapamil och diltiazem (se ”Andra läkemedel och Propranolol Ebb”).
- eller någon i din familj har (eller har haft) psoriasis.

Om du ska genomgå en operation, tala om för narkosläkaren att du tar Propranolol Ebb.

Om du använder kontaktlinser kan det kännas obekvämt, eftersom Propranolol Ebb minskar tårproduktionen.

Om du är rökare kan effekten av Propranolol Ebb vara nedsatt.

Andra läkemedel och Propranolol Ebb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Propranolol Ebb kan påverka effekten av vissa andra läkemedel och vissa andra läkemedel kan ha en effekt på Propranolol Ebb.

Propranolol Ebb ska inte användas tillsammans med kalciumkanalblockerare som ger en minskning av hjärtats slagkraft (t.ex. verapamil, diltiazem) eftersom det kan leda till en förstärkning av dessa effekter. Detta kan leda till mycket lågt blodtryck (svår hypotoni) och långsam hjärtfrekvens (bradykardi).

Andra läkemedel som kan orsaka problem när de tas tillsammans med läkemedlet:

- nifedipin, nisoldipin, nikardipin, israpidin, lacidipin (används för att behandla hypertoni eller kärlkramp)
- lidokain (lokalbedövning)
- disopyramid, kinidin, amiodaron, propafenon och glykosider (för att behandla hjärtproblem)
- adrenalin (ett hjärtstimulerande medel)
- ibuprofen och indometacin (för smärta och inflammation)
- ergotamin, dihydroergotamin eller rizatriptan (för migrän)
- klorpromazin och tioridazin (för vissa psykiatriska störningar)
- cimetidin (för magproblem)
- rifampicin (för behandling av tuberkulos)

- teofyllin (för astma)
- warfarin (för att tunna ut blodet) och hydralazin (för hypertoni)
- fingolimod (för behandling av multipel skleros)
- fluvoxamin och barbiturater (för behandling av ångest och sömnproblem)
- MAO-hämmare (för att behandla depression)

Om du tar klonidin (för hypertoni eller migrän) och Propranolol Ebb tillsammans, får du inte sluta ta klonidin om inte läkaren säger att du ska göra det. Om det blir nödvändigt för dig att sluta ta klonidin, kommer läkaren att ge dig noggranna anvisningar om hur du ska göra det.

Propranolol Ebb med mat, dryck och alkohol

Alkohol kan påverka effekten av detta läkemedel.

Operationer

Om du åker in på sjukhus för att genomgå en operation, tala om för narkosläkaren eller vårdpersonalen att du tar Propranolol Ebb.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att läkemedlet påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Dock kan vissa personer ibland uppleva yrsel eller trötthet när de tar Propranolol Ebb. Om detta händer dig, rådfråga läkare.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet:

Användning av detta läkemedel rekommenderas inte under graviditet, om inte läkaren anser att det är nödvändigt.

Amning:

Amning rekommenderas inte när du tar detta läkemedel.

Propranolol Ebb innehåller:

Propranolol Ebb innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

3. Hur du använder Propranolol Ebb

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Svälj propranololtabletten med ett glas vatten före maten. Sväljes hel. Tugga inte.

Sluta inte ta detta läkemedel om inte din läkare har rått dig till detta.

Vuxna

Följande tabell visar rekommenderad dos för en vuxen:

	Rekommenderad dos	Total daglig dos (maximalt)
Hypertoni (högt blodtryck)	Initialt 40 mg två eller tre gånger per dag som kan ökas med 80 mg per dag med veckointervall.	160 mg till 320 mg
Kärlkramp (bröstsmärta) och tremor	Initialt 40 mg två till tre gånger per dag som kan ökas med 40 mg med veckointervall.	120 mg till 240 mg
Skydd av hjärtat efter en hjärtattack	Initialt 40 mg fyra gånger per dag som efter några dagar ändras till 80 mg två gånger per dag.	160 mg
Migrän	Initialt 40 mg två till tre gånger per dag som kan ökas med 40 mg per dag i veckointervall.	80 mg till 160 mg
Arytmier (oregelbunden hjärtrytm),* hypertyreos och tyreotoxikos (vissa sköldkörtelsjukdomar) och hypertrofisk kardiomyopati (förtjockad hjärtmuskel)	10 till 40 mg tre eller fyra gånger per dag	120 mg till 160 mg
Feokromocytom	Före en operation: 60 mg per dag. Ej opererbar behandlingsdos: 30 mg per dag.	30 mg till 60 mg
Leversjukdom på grund av högt blodtryck	Initialt 40 mg två gånger per dag som ökas till 80 mg två gånger per dag	160 mg till 320 mg

Pediatrisk population

Propranolol Ebb kan också användas för att behandla barn med migrän och arytmier:

- Vid migrän är dosen till barn under 12 år 20 mg två eller tre gånger per dag och för barn över 12 år är dosen densamma som till vuxna.
- Vid arytmier ska dosen justeras av läkaren enligt barnets ålder eller vikt.

Äldre

Äldre ska börja med den lägsta dosen. Den optimala dosen ska fastställas individuellt av läkaren.

Lever- eller njursvikt

Den optimala dosen ska fastställas individuellt av läkaren.

Om du har tagit för stor mängd av Propranolol Ebb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdoserar orsakar en ytterst långsam hjärtfrekvens, för lågt blodtryck, hjärtsvikt och andningssvårigheter med symtom som trötthet, hallucinationer, fin tremor (darrningar), förvirring, illamående, kräkningar, kroppsspasmer, svimning eller koma, lågt blodsocker. Ta alltid med dig kvarvarande tabletter, förpackningen och etiketten, så att läkemedlet kan identifieras.

Om du har glömt att ta Propranolol Ebb

Om du glömmar att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det dock nästan är dags för nästa dos, hoppa då över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Propranolol Ebb

Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först tala med läkaren. I vissa fall kan det vara nödvändigt att sluta ta läkemedlet gradvis.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Du kan få följande biverkningar av detta läkemedel.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

- kalla fingrar och tår
- långsam hjärtrytm, hållningsrelaterat blodtrycksfall, kollaps, hjärklappning, hjärtrytmstörningar, försämring av svagt hjärta
- domning och spasm i fingrarna som följs av värme och smärta (Raynauds fenomen)
- sömnsvärigheter/mardrömmar, särskilt i början av behandlingen: yrsel, förvirring
- trötthet och/eller utmattning (ofta övergående)
- allergiska hudreaktioner: rodnad, klåda, utslag, håravfall

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

- illamående, kräkningar och diarré eller förstoppning
- muskelsvaghet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

- anfall med andningssvårigheter på grund av trånga luftvägar eller försämring av andningsbesvär, vissa med dödlig utgång, om du har eller har haft astma eller astmatiska problem
- hjärtsvikt, försämring av hjärtproblem
- svullnad av huden som kan uppstå i ansikte, tunga, struphuvud, buk eller arm och ben (angioödem)
- yrsel, särskilt när du reser dig upp
- försämring av blodcirkulation i armar och ben, om du redan har dålig blodcirkulation
- humörsvängningar
- förvirring
- psykos eller hallucinationer (efter att ha avbrutit läkemedelsbehandlingen för snabbt)
- parestesi (avvikande känsel, vanligtvis stickningar eller domningar)
- synstörningar
- torra ögon
- läkemedlet kan förändra blodkropparnas antal och typ, såsom minska antalet blodplättar (trombocytopeni) i blodet som kan göra att du lättare får blåmärken eller blödningar
- lila prickar på huden (purpura), stora områden med håravfall, psoriasisliknande hudreaktioner (även år senare), försämring av psoriasis
- muntorrhet

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

- brist eller mycket kraftig minskning av vita blodkroppar
- tillfällig ökning av vissa vita blodkroppar (övergående eosinofili)
- försämring av en viss patologisk, allvarlig muskelsvaghet (myastenia gravis), huvudvärk, depressiva sinnesstämningar
- låga blodsockernivåer kan uppkomma hos patienter med och utan diabetes inklusive äldre, patienter med en konstgjord njure (dialys) eller patienter som får läkemedelsbehandling för diabetes. Det kan också uppkomma hos patienter som fastar eller nyligen har fastat eller som har en långvarig leversjukdom
- försämring av diabetes, förändring av vissa blodlipidvärden (minskning av HDL-kolesterol,

- ökning av triglycerider)
- kraftiga svettningar
- konjunktivit (ögoninflammation)
- muskelvärk, muskelkramper
- vid långtidsbehandling: artropati (ledsjukdom)
- försämring av njurfunktionen vid gravt nedsatt njurfunktion
- libido och erektila störningar
- ökning eller höjning av vissa blodvärden (GOT, GPT, ANA)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- andfåddhet eller andnöd (dyspné)
- depression

Avbrytning av läkemedelsbehandling (även på grund av ovanstående reaktioner) bör endast ske efter samråd med din läkare och bör i allmänhet ske gradvis.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

- Sänkta blodsockernivåer hos nyfödda, spädbarn och barn
Okänd (frekvens kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data):
- Kramper på grund av sänkta blodsockernivåer hos nyfödda, spädbarn och barn

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Propranolol Ebb ska förvaras

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Inga särskilda förvaringsanvisningar.
- Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är propranololhydroklorid. En filmdragerad tablett innehåller 10 mg propranololhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är:

majsstärkelse
laktosmonohydrat
cellulosa, mikrokristallin (E460)
magnesiumstearat

Tablettdragering:
hypromellos (E464)
cellulosa, mikrokristallin (E460)

acetylerade monoglycerider och diglycerider
titandioxid (E171)

Läkemedlets utseende

10 mg: Vit till benvit, rund, bikonvex (rundad på bägge sidor), filmdragerad tablett märkt "AI" på den ena sidan och en brytskåra på den andra sidan.

Brytskåran är endast till för att dela tabletten för att underlätta nedsväljning och inte för att dela i lika stora doser.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller
UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

Tillverkare

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o., Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-06-09