

Bipacksedel: Information till användaren

Propylenglykol Evolan 200 mg/g kutan emulsion

propylenglykol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte blir bättre eller om du blir sämre.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Propylenglykol Evolan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Propylenglykol Evolan
3. Hur du använder Propylenglykol Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Propylenglykol Evolan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Propylenglykol Evolan är och vad det används för

Propylenglykol Evolan är en mjukgörande emulsion (lotion) som har vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier.

Propylenglykol Evolan används för att behandla torr hud av olika slag hos vuxna och barn.

Propylenglykol som finns i Propylenglykol Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Propylenglykol Evolan

Använd inte Propylenglykol Evolan

- om du är allergisk mot propylenglykol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Använd inte Propylenglykol Evolan

- på brännskadad hud
- i hörselgången eftersom propylenglykol kan skada örat

Graviditet och amning

Inga kända risker under graviditet.

Använd inte Propylenglykol Evolan på eller omkring bröstvårtorna vid amning för att undvika att barnet oavsiktligt får i sig läkemedlet.

Körförmåga och användning av maskiner

Propylenglykol Evolan påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Propylenglykol Evolan innehåller cetylalkohol

Cetylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

3. Hur du använder Propylenglykol Evolan

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Vuxna och barn

Emulsionen stryks på vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk men ej kladdig. Det är bättre att smörja tunt och ofta än tjockt och sällan. Efter bad eller dusch är det också viktigt att smörja in sig, eftersom en del av de naturliga fuktighetsbevarande ämnen som normalt finns i huden kan ha tvättats bort.

Om du eller ett barn tagit för stor mängd av Propylenglykol Evolan

Om du eller ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Övergående sveda och värmekänsla. Detta förekommer oftast i början av behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Propylenglykol Evolan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är propylenglykol 200 mg/g
- Övriga innehållsämnen är karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, metylglukosseskvistearat, PEG-20 metylglukosseskvistearat, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit emulsion (lotion) i plastburk med pump.

Förpackningsstorlekar: 480 g och 510 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd

Tillverkare

S.C. Laropharm S.R.L

Alexandriei street 145 A

Bragadiru, Ilfov, 077025 Rumänien

Denna bipacksedel ändrades senast 2023-06-29