

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Prospan, oral lösning i endosbehållare (endos)

Extrakt av murgröna

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Prospan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Prospan
3. Hur du använder Prospan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Prospan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Prospan är och vad det används för

Prospan är ett växtbaserat läkemedel använt för lindring av hosta med segt slem.

Prospan innehåller saponiner som anses ha en slemlösande effekt och underlätta upphostning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Prospan

Använd inte Prospan

- om du är allergisk mot murgröna, andra araliaväxter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- till barn under 2 år, på grund av risk för försämring av symtom från luftvägarna.

Varningar och försiktighet

Vid långvarig hosta (mer än 2 veckor) eller vid hosta som åtföljs av symtom såsom feber i 4 dagar eller mer, andnöd, bröstsmärta, allmänpåverkan, viktnedgång eller blodiga upphostningar, bör läkare kontaktas.

Prospan kan försämra symtom av magkatarr och magsår. Om du har magkatarr eller magsår och märker att dina magbesvär försämras, bör du sluta att använda Prospan.

Prospan rekommenderas inte till barn under 6 år, eftersom erfarenheten är begränsad.

Andra läkemedel och Prospan

Hostdämpande läkemedel som innehåller kodein eller dextrometorfan bör inte användas samtidigt med Prospan.

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Prospan med mat

Effekten av samtidigt intag av mat är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Prospan inte användas av gravida eller ammande kvinnor. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Prospan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Prospan innehåller sorbitol

Prospan innehåller sötningsmedlet sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du därför kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Prospan

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 1 endosbehållare (5 ml) 3 gånger dagligen.


Barn 6-11 år: 1 endosbehållare (5 ml) 2 gånger dagligen.

Prospan rekommenderas inte till barn under 6 år och ska inte ges till barn under 2 år.

Massera endosbehållaren lätt före användning!



Massera endosbehållaren lätt före användning, som bilden visar.



Håll endosbehållaren i ett stadigt grepp och riv upp förpackningen.



Svälj läkemedlet, samtidigt som du trycker på förpackningen tills den är tom.

Om du använt för stor mängd av Prospan

Vid överdosering kan illamående, kräkningar, diarré och agitation (rastlöshet och kraftig oro) förekomma.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Prospan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Fall av magtarmbesvär (illamående, kräkningar, diarré) och allergiska reaktioner (klåda, hudutslag, andnöd) har rapporterats. Viss laxerande effekt på grund av sorbitol-innehållet kan förekomma.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Prospan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på endosbehållaren efter utg.dat. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen per endosbehållare (5ml) är 35 mg extrakt av *Hedera helix* L. (murgröna), blad motsvarande cirka 175 till 262,5 mg torkade blad från murgröna.
- Övriga innehållsämnen är:
Renat vatten
Sorbitol, flytande (kristalliserande) (E 420)
Xantangummi
Kaliumsorbat (E202)
Apelsinsmakämne
Citronsyra (E330)
Pepparmintsmakämne (maltodextrin, majsstärkelse, pepparmintsmak)
Levomentol

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

21 endosbehållare à 5 ml oral lösning, i ytterkartong.
Ljus brun, lätt grumlig lösning med söt och fruktig smak.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3D
61138 Niederdorfelden
Tyskland
Tel: ++49 6101 539 300
Fax: ++49 6101 539 315
E-post: info@engelhard-am.de

Denna bipacksedel godkändes senast: 2020-09-01