

Bipacksedel: Information till användaren

Replens vaginalgel

vatten

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 månaders behandling.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Replens är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Replens
3. Hur du använder Replens
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Replens ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Replens är och vad det används för

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 månaders behandling.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Replens används mot torrhet i slidan hos kvinnor där menssen upphört. Det verkar genom att öka fuktigheten i slidan.

2. Vad du behöver veta innan du använder Replens

Använd inte Replens:

- om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du samtidigt använder andra läkemedel som ges i slidan.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Replens.

Replens är inget preventivmedel och innehåller inga spermiedödande medel. Det går bra att använda Replens om din partner använder kondom.

Hos ett fåtal kvinnor kan lätta flytningar förekomma i början av behandlingen med Replens. Detta är inget farligt eller onormalt utan beror på att en del döda ytceller lossnat.

Andra läkemedel och Replens

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Replens ska ej användas under graviditet eller perioden strax efter födsel.

Det är okänt om Replens går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Replens har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3. Hur du använder Replens

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En applicering i slidan tre gånger per vecka, företrädesvis på morgonen. Replens skall inte användas två eller fler dagar i rad.


Det kan ofta dröja upp till en månad innan man får effekt av preparatet. Om torrheten i slidan kvarstår efter tre månaders behandling, vänd dig till din läkare för råd.

Annan dos enligt läkares föreskrift.


Bruksanvisning

Replens applicerar Du direkt i slidan med den specialtillverkade engångsapplicatorn. Tag först ut applicatorn från pappersomslutningen. Vrid EJ av hatten.

1. Fatta tag om den tjockare delen av applicatorn och skaka den som en febertermometer så att gelen rinner ned i den smalare änden.



2. Bryt av hatten.



3. Du för lättast in applicatorn i slidan om du sitter på huk eller ligger på ryggen med benen sårade.



4. Tryck hårt och snabbt på den tjockare delen så att fuktgelen kommer in i slidan. Håll applikatorn intryckt när du tar ut den och släng den därefter. OBS! Spola inte ned den i toaletten.



Om du använt för stor mängd av Replens

Replens har inga toxiska effekter och någon risk för överdosering anses inte finnas. Om du ändå misstänker att du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning..

Om du har glömt att använda Replens

Om du glömmet att ta en dos så är det bara att ta den så fort du kommer ihåg.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats för Replens:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Vita flytningar.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Klåda och hudirritation i slidan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Replens ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Användes före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är vatten. 1 dos (2,5 g) i engångsapplicator innehåller 1970,5 mg.
- Övriga innehållsämnen är glycerin, lättflytande paraffin, polykarbofil, mättade palmoljegylycerider, Carbomer 974P, sorbinsyra (konserveringsmedel), natriumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Replens är en vaginalgel förpackad i engångsapplikator med hatt av vit polyetylen. Varje applikator innehåller 5,9 g gel och ger 2,5 g gel. Applikatorerna är individuellt förpackade och förseglade i folie och levereras i kartonger innehållande 10 st.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Medlite A/S
Postboks 299
1377 Billingstad
Norge

Tillverkare

Central Pharma (Contract Packaging) Ltd.
Caxton Road
Bedford MK41 0XZ
England

Medlite A/S
Myrveien 8B
1397 Nesøya
Norge

Denna bipacksedel ändrades senast

2025-03-24