

Bipacksedel: Information till användaren

Risedronat Abacus Medicine 35 mg filmdragerad tablett

risedronatnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Risedronat Abacus Medicine är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Risedronat Abacus Medicine
3. Hur du använder Risedronat Abacus Medicine
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Risedronat Abacus Medicine ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Risedronat Abacus Medicine är och vad det används för

Risedronat Abacus Medicine används för **behandling av osteoporos** hos

- kvinnor som genomgått klimakteriet, även om de har svår osteoporos (benskörhet). Preparatet minskar risken för ryggrad- och höftfrakturer.
- män med hög risk för frakturer.

Postmenopausal osteoporos (benskörhet) är ett tillstånd som drabbar kvinnor efter menopausen (klimakteriet) när skelettet blir svagare, mer ömtåligt och benbrott är mer troligt i samband med fall eller påfrestning. Osteoporos kan även drabba män av ett antal anledningar inklusive åldrande och/eller låga nivåer av det manliga könshormonet testosteron.

Ryggkota, höft och handled är de ben som vanligen bryts även om det kan hända vilket ben som helst i din kropp. Frakturer p.g.a. osteoporos kan även orsaka ryggont, förkorta kroppslängden och ge krökt rygg. Många patienter med osteoporos upplever inga symtom och du kanske inte ens vet att du har sjukdomen.

Risedronat Abacus Medicine tillhör en grupp icke-hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater som används för att behandla skelettsjukdomar. Det verkar direkt på benvävnaden och gör benen starkare, vilket minskar risken för benbrott.

Ben är levande vävnad. Gammalt ben försvinner kontinuerligt från ditt skelett och ersätts med nytt ben.

Risedronatnatrium som finns i Risedronat Abacus Medicine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Risedronat Abacus Medicine

Ta inte Risedronat Abacus Medicine om

- du är **allergisk** mot risedronatnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- **kalciumhalten** i ditt blod är **onormalt låg**
- det finns en möjlighet att du är **gravid**, är gravid eller planerar att bli gravid
- du **ammar**
- du har svåra **njurproblem**.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Risedronat Abacus Medicine om något av följande gäller dig:

- om du inte kan stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter
- om du har onormal ben- eller mineralomsättning, t.ex.:
 - brist på vitamin D
 - onormal halt av bisköldkörtelhormonerBåda omständigheterna kan orsaka en onormalt låg kalciumhalt i kroppen.
- om du tidigare har haft problem med matstrupen, t ex haft smärta eller svårigheter att svälja mat eller har tidigare fått diagnosen Barretts esofagus (ett tillstånd förenat med cellförändringar i nedre delen av matstrupen)
- om du har eller tidigare har haft smärta, svullnad eller domning i käken, tyngdkänsla i käken eller tandlossning
- om du får tandvård eller kommer att genomgå tandkirurgi
Berätta för din tandläkare att du behandlas med Risedronat Abacus Medicine.
- om din läkare har berättat att du inte tål vissa sockerarter (såsom laktos).

Barn och ungdomar

Risedronat Abacus Medicine rekommenderas inte för användning hos barn under 18 år på grund av otillräcklig data gällande säkerhet och effekt.

Andra läkemedel och Risedronat Abacus Medicine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Läkemedel som innehåller något av följande minskar effekten av Risedronat Abacus Medicine om de tas samtidigt:

- kalcium
- magnesium
- aluminium, som finns i till exempel preparat mot halsbränna
- järn

Ta dessa läkemedel minst 30 minuter efter att du har tagit din Risedronat Abacus Medicine tablett.

Risedronat Abacus Medicine med mat och dryck

Risedronat Abacus Medicine tabletter **får inte tas med mat eller dryck** (vanligt vatten är tillåtet). Annars kommer läkemedlet att mista sin verkan. Detta gäller särskilt mejeriprodukter (såsom mjölk) eftersom de innehåller kalcium (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Risedronat Abacus Medicine").

Mat och dryck (annat än vanligt vatten) får intas först då det har gått minst 30 minuter sedan du tog en Risedronat Abacus Medicine tablett.

Graviditet och amning

Ta inte Risedronat Abacus Medicine om det finns en möjlighet att du är gravid, är gravid eller planerar att bli gravid (se avsnitt 2, "Ta inte Risedronat Abacus Medicine").

Risken med användning av risedronatnatrium hos gravida kvinnor är okänd.
Ta inte Risedronat Abacus Medicine om du ammar (se avsnitt 2, ”Ta inte Risedronat Abacus Medicine”).

Risedronat Abacus Medicine ska bara användas för att behandla postmenopausala kvinnor och män.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Såvitt man vet har Risedronat Abacus Medicine ingen verkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Risedronat Abacus Medicine innehåller laktos och natrium

Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin (se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

3. Hur du använder Risedronat Abacus Medicine

Dosering

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 1 tablett en gång i veckan.

Välj den veckodag som passar bäst för dig. Ta en tablett Risedronat Abacus Medicine varje vecka på denna veckodag.

Användningssätt

Tabletten ska tas hel:

- **på morgonen** minst 30 minuter före första intaget av mat, dryck (förutom vanligt vatten) eller andra läkemedel
- medan du sitter eller står, för att undvika halsbränna
- med minst ett glas (120 ml) vanligt vatten.
- Svälj tabletten hel. Sug eller tugga inte på tabletten.

Lägg dig inte förrän minst 30 minuter har gått efter tablettintaget.

Din läkare kommer att berätta för dig om du behöver kalcium- eller vitamintillägg.

Behandlingens längd

Tala med din läkare innan du överväger att avbryta behandlingen. Din **läkare bestämmer** detta.

Om du har tagit för stor mängd av Risedronat Abacus Medicine

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Drick ett glas mjölk och kontakta omgående din läkare eller sjukhus om du har tagit fler tabletter än du borde.

Om du har glömt att ta Risedronat Abacus Medicine

Om du har glömt att ta tabletten den veckodag du har valt, ska du ta den samma dag du kommer ihåg saken. Fortsätt sedan ta en tablett i veckan på den sedvanliga veckodagen.

Ta inte två tabletter samma dag för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Risedronat Abacus Medicine

Om du slutar med behandlingen är det möjligt att din benmassa börjar minska. Diskutera saken med din läkare innan du avbryter behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Risedronat Abacus Medicine och kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande:

- symtom på **allvarlig allergisk reaktion** såsom:
 - svullnad i ansikte, läppar, tunga, svalg och/eller hals
 - sväljningssvårigheter
 - svårigheter att andas
 - nässelutslag och hudutslagDenna biverkning har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).
- allvarliga **hudreaktioner**, såsom:
 - blåsbildning i hud, mun, ögon och andra slemhinnor (t.ex. könsorganen) (Stevens-Johnsons syndrom)
 - kännbara röda prickar på huden som orsakas av inflammationer i små blodkärl (leukocytoklastisk vaskulit)
 - rött hudutslag över många delar av kroppen och/eller med avflagnings av hudens yttersta lager (toxisk epidermal nekrolys).Denna biverkning har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).

Kontakta din läkare omedelbart om du har:

- ögoninflammation, oftast med smärta, rodnad och ljuskänslighet. Denna biverkning har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).
- inflammation i ögonhålan - en inflammation i de vävnader som omger ögonglobens strukturer, vilket kan orsaka symtom som smärta, svullnad, rött öga, utstående öga och synstörningar. Denna biverkning har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).
- benvävnadsdöd i käken (osteonekros) som kopplas samman med försenad läkning och infektioner, ofta i samband med tandutdragning (se avsnitt 2 "Varningar och försiktighet"). Denna biverkning har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).
- smärta vid sväljning och svårighet att svälja, bröstsmärta, ny eller förvärrad halsbränna. Denna biverkning är mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Övriga biverkningar som observerats i kliniska studier var vanligtvis milda och resulterade inte i att patienten behövde avbryta sin behandling.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- matsmältningsproblem, illamående, buksmärta, kramper eller obehag i magen, förstoppning, känsla av att magen är full, gasbesvär, diarré
- smärta i benen, musklerna eller lederna
- huvudvärk

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- inflammation eller sår i matstrupen som orsakar svårighet att svälja och smärta vid sväljning (se avsnitt 2 "Varningar och försiktighet")
- inflammation i magsäcken och tolvfingertarmen (tarmen som magsäcken tömmer sig i).
- inflammation i regnbågshinnan med rodnad och smärta i ögonen samt synstörningar

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

- inflammation i tungan med svullnad och eventuellt smärta
- förträngningar i matstrupen
- onormala resultat i leverfunktionstester
- minskad halt av kalcium eller fosfat i blodet (dessa förändringar är oftast lindriga, förekommer i början av behandlingen och ger inga symtom).
- Ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan förekomma i sällsynta fall.
Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

- Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.

Efter att läkemedlet kommit ut på marknaden har följande biverkningar (med okänd frekvens) rapporterats:

- Håravfall
- Leversjukdomar, i vissa fall allvarliga.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Risedronat Abacus Medicine ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister eller kartongen efter "EXP".
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är risedronatnatrium. Varje filmdragerad tablett innehåller 35 mg risedronatnatrium, motsvarande 32,5 mg risedronsyra.
- Övriga innehållsämnen är i tablettkärnan mikrokristallin cellulosa, krospovidon, laktosmonohydrat, magnesiumstearat och i filmdrageringen hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ovala, orange, runda på båda sidorna och bär märkningen "35" på den ena sidan.

De filmdragerade tabletterna är förpackade i PVC/Alu-blisterförpackningar och insatta i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 12 filmdragerade tabletter.

Parallelimpörtör, Ompackare och Tillverkare

Parallelimpörtör:

Abacus Medicine A/S, Köpenhamn, Danmark

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Ompackare:

Abacus Medicine B.V., Alkmaar, Nederländerna

Tillverkare

Novartis-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast:

2026-08-11