

Bipacksedel: Information till användaren

Rivaroxaban Zentiva 10 mg hårda kapslar

rivaroxaban

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Rivaroxaban Zentiva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Rivaroxaban Zentiva
3. Hur du tar Rivaroxaban Zentiva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rivaroxaban Zentiva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rivaroxaban Zentiva är och vad det används för

Rivaroxaban Zentiva innehåller den aktiva substansen rivaroxaban och används hos vuxna för att

- förhindra blodproppar i venerna efter genomgången höft- eller knäledsoperation. Läkaren har ordinerat detta läkemedel till dig eftersom du löper ökad risk för att få blodproppar efter en operation.
- behandla blodproppar i venerna i benen (djup ventrombos) och i blodkärlen i lungorna (lungemboli), och förhindra att blodproppar återkommer i blodkärlen i benen och/eller lungorna.

Rivaroxaban Zentiva tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia ("blodförtunnande").

Rivaroxaban Zentiva fungerar genom att blockera en blodkoagulationsfaktor (faktor Xa) och minskar därmed blodets benägenhet att levra sig.

Rivaroxaban som finns i Rivaroxaban Zentiva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Rivaroxaban Zentiva

Ta inte Rivaroxaban Zentiva

- Om du är allergisk mot rivaroxaban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du blöder mycket.
- Om du har en sjukdom eller tillstånd i något av kroppens organ som ökar risken för allvarlig blödning (t.ex. magsår, skada eller blödning i hjärnan, nyligen genomgången kirurgi i hjärnan eller ögonen).
- Om du tar läkemedel för att hindra blodet att levra sig (t.ex. warfarin, dabigatran, apixaban eller heparin), förutom vid byte av blodproppshämmande behandling eller om du har en ven- eller artärkateter som spolats med heparin för att hålla katetern öppen.
- Om du har en leversjukdom som leder till ökad blödningsrisk.
- Om du är gravid eller ammar.

Ta inte Rivaroxaban Zentiva och tala om för läkaren om något av detta gäller dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rivaroxaban Zentiva.

Var särskilt försiktig med Rivaroxaban Zentiva

- Om du har ökad blödningsrisk som kan vara fallet om du har:
 - måttlig eller svår njursjukdom, eftersom njurfunktionen kan påverka den mängd läkemedel som har effekt i kroppen.
 - om du tar andra läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin, dabigatran, apixaban eller heparin), vid byte av blodproppshämmande behandling eller om du har en ven- eller artärkateter som spolas med heparin för att hålla katetern öppen (se avsnitt "Andra läkemedel och Rivaroxaban Zentiva").
 - blödningsrubbningsr.
 - mycket högt blodtryck som inte kontrolleras med läkemedelsbehandling.
 - mag- eller tarmsjukdom som kan leda till blödning, t.ex. inflammation i mage eller tarm, eller inflammation i matstrupe t.ex. på grund av refluxsjukdom (tillstånd då magsyra kommer upp i matstrupen) eller tumörer lokaliserade i magsäcken, tarmarna, könsorganen eller urinvägarna.
 - problem med blodkärlen i ögonbotten (retinopati).
 - en lungsjukdom där luftrören vidgas och fylls av var (bronkiektasi), eller tidigare blödning från lungorna.
- Om du har en hjärtklaffsprot.
- Om du vet att du har en sjukdom som kallas antifosfolipidsyndrom (en störning i immunsystemet som ökar risken för att få blodproppar). Informera i sådana fall din läkare, som kommer att besluta om behandlingen kan behöva ändras.
- Om din läkare konstaterar att ditt blodtryck är instabilt eller om annan behandling eller kirurgiskt ingrepp planeras för att ta bort blodproppen från dina lungor.

Om något av ovanstående gäller dig, tala om det för läkaren innan du tar Rivaroxaban Zentiva. Läkaren kommer då att bestämma om du ska behandlas med detta läkemedel och om du behöver övervakas noggrannare.

Om du behöver genomgå en operation

- är det mycket viktigt att ta Rivaroxaban Zentiva före och efter operationen vid exakt de tidpunkter som läkaren har talat om för dig.
- om din operation medför en kateter eller injektion i ryggraden (t.ex. för epidural- eller spinalanestesi eller smärtlindring):
 - det är mycket viktigt att ta Rivaroxaban Zentiva exakt vid de tider som läkaren talat om för dig.
 - tala omedelbart om för läkaren om du får domningar eller känner svaghet i benen eller får problem med tarmen eller blåsan efter avslutad bedövning, eftersom det är nödvändigt med snabb vård.

Barn och ungdomar

Rivaroxaban Zentiva 10 mg kapslar **rekommenderas inte till personer under 18 års ålder**. Det finns inte tillräcklig information om användning hos barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Rivaroxaban Zentiva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

- **Om du tar:**

- vissa läkemedel för svampinfektioner (t.ex. flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) såvida de inte endast appliceras på huden.
- ketokonazoltabletter (används för Cushings syndrom – när kroppen producerar för mycket kortisol).
- vissa läkemedel för bakteriella infektioner (t.ex. klaritromycin, erytromycin).
- vissa antiviralläkemedel för HIV/AIDS (t.ex. ritonavir).
- andra läkemedel som minskar blodkoagulationen (t.ex. enoxaparin, klopido­grel eller vitamin K- antagonister som warfarin och acenokumarol).
- antiinflammatoriska och smärtlindrande läkemedel (t.ex. naproxen eller acetylsalicylsyra).
- dronedaron, ett läkemedel för att behandla onormala hjärtslag.
- vissa läkemedel mot depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)).

Om något av ovanstående gäller dig, tala om det för läkaren innan du tar

Rivaroxaban Zentiva, eftersom effekten av Rivaroxaban Zentiva kan öka. Läkaren kommer då att bestämma om du ska behandlas med detta läkemedel och om du behöver övervakas noggrannare.

Om din läkare anser att du löper ökad risk att utveckla mag- eller tarmsår, kan du få förebyggande behandling mot detta.

- **Om du tar:**

- vissa läkemedel för behandling av epilepsi (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital).
- Johannesört (*Hypericum perforatum*), ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används mot lätt nedstämdhet och lindrig oro.
- rifampicin, ett antibiotikum.

Om något av ovanstående gäller dig, tala om det för läkaren innan du tar Rivaroxaban Zentiva, eftersom effekten av Rivaroxaban Zentiva kan minska. Läkaren kommer då att bestämma om du ska behandlas med Rivaroxaban Zentiva och om du behöver övervakas noggrannare.

Graviditet och amning

Ta inte Rivaroxaban Zentiva om du är gravid eller ammar. Om det finns en möjlighet att du kan bli gravid ska du använda tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar Rivaroxaban Zentiva. Om du blir gravid under tiden du tar detta läkemedel ska du omedelbart tala om det för läkaren som bestämmer hur du ska behandlas.

Körförmåga och användning av maskiner

Rivaroxaban Zentiva kan ge upphov till yrsel (vanlig biverkan) och svimning (mindre vanlig biverkan) (se avsnitt 4, "Eventuella biverkningar"). Du ska inte köra bil eller använda maskiner om du har dessa symtom.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rivaroxaban Zentiva innehåller laktos (mjölksocker) och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du tar Rivaroxaban Zentiva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket du ska ta

- **för att förhindra blodproppar i venerna efter genomgången höft- eller knäledsoperation.**
Rekommenderad dos är en kapsel Rivaroxaban Zentiva 10 mg en gång dagligen.
- **för att behandla blodproppar i venerna i benen och blodproppar i blodkärlen i lungorna, och förhindra att blodproppar återkommer.**
Efter minst 6 månaders blodproppsbehandling är rekommenderad dos antingen en 10 mg kapsel en gång dagligen eller en 20 mg kapsel en gång dagligen. Din läkare har ordinerat Rivaroxaban Zentiva 10 mg en gång dagligen åt dig.

Svälj helst tabletten med vatten.

Rivaroxaban Zentiva kan tas med eller utan mat.

Om du har svårt att svälja kapseln hel, prata med läkaren om andra sätt att ta Rivaroxaban Zentiva. Innehållet i kapseln kan blandas med vatten eller äppelmos precis innan du tar den. Vid behov kan läkaren också ge dig kapselinnehållet via en magsond.

När du tar Rivaroxaban Zentiva

Ta kapseln varje dag tills läkaren talar om för dig att du ska sluta.

Försök ta kapseln vid samma tidpunkt varje dag så blir det lättare att komma ihåg.

Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska fortsätta behandlingen.

För att förhindra blodproppar i venerna efter genomgången höft- eller knäledsoperation ska du ta den första kapseln 6-10 timmar efter operationen.

Om du har genomgått en större höftoperation tar du vanligtvis kapslarna i 5 veckor.

Om du har genomgått en större knäoperation tar du vanligtvis kapslarna i 2 veckor.

Om du har tagit för stor mängd av Rivaroxaban Zentiva

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Risken för blödning ökar om du tar för mycket Rivaroxaban Zentiva.

Om du har glömt att ta Rivaroxaban Zentiva

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Ta nästa kapsel följande dag och fortsätt sedan att ta en kapsel en gång dagligen som vanligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.

Om du slutar att ta Rivaroxaban Zentiva

Sluta inte ta Rivaroxaban Zentiva utan att först tala med din läkare, eftersom Rivaroxaban Zentiva förhindrar att ett allvarligt tillstånd utvecklas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Liksom andra liknande läkemedel som minskar bildningen av blodproppar, kan Rivaroxaban Zentiva orsaka blödning som ibland kan vara livshotande. Kraftig blödning kan leda till ett

plötsligt blodtrycksfall (chock). I vissa fall är blödningen kanske inte uppenbar.

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av följande biverkningar:

- **Tecken på blödning**

- Blödning i hjärnan eller inuti huvudet (symtom kan vara huvudvärk, ensidig svaghet, kräkningar, krampanfall, minskad medvetenhetsnivå och nackstyvhet).
En allvarlig medicinsk nödsituation. Sök genast läkare!
- långvarig eller kraftig blödning
- ovanlig svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk, oförklarlig svullnad, andfåddhet, bröstsmärta eller kärlkramp.

Läkaren kan bestämma att du ska övervakas noggrannare eller ändra behandlingen.

- **Tecken på allvarlig hudreaktion**

- kraftiga hudutslag som sprider sig, blåsor eller såriga slemhinnor, t.ex i munnen eller ögonen (Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys).
- en biverkning som orsakar utslag, feber, inflammation i inre organ, onormala blodvärden och systemisk sjukdom (DRESS-syndrom).

Frekvensen för dessa biverkningar är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

- **Tecken på allvarliga allergiska reaktioner**

- svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, utslag, andningssvårigheter, plötsligt blodtrycksfall.

Frekvensen av allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynt (anafylaktiska reaktioner, inkl anafylaktisk chock (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) och mindre vanliga (angioödem och allergiskt ödem kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Fullständig lista över eventuella biverkningar

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- minskning av antalet röda blodkroppar, vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet eller andfåddhet.
- blödning i mage eller tarm, blödning i urinvägar eller könsorgan (inklusive blod i urinen och riklig menstruationsblödning), näsblödning, blödning från tandköttet.
- blödning i ögat (inklusive blödning från ögonvitorna).
- blödning i vävnad eller hålrum i din kropp (blodutgjutning, blåmärke).
- blodig hosta.
- blödning i huden eller under huden.
- blödning efter en operation.
- sipprande av blod eller vätska från ett kirurgiskt sår.
- svullnad i armar eller ben.
- smärta i armar eller ben.
- försämrad njurfunktion (kan ses i prover som tas av läkaren).
- feber.
- ont i magen, magbesvär, illamående eller kräkning, förstoppning, diarré.
- lågt blodtryck (symtom kan vara att du känner dig yr eller svimmar när du reser dig upp).
- minskad allmän kraft och energi (svaghet, trötthet), huvudvärk, yrsel.
- utslag, klåda i huden.
- blodtester kan visa en ökning av vissa leverenzymmer.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- blödning i hjärnan eller inuti huvudet (se ovan, tecken på blödning).
- blödning i en led vilket kan ge smärta och svullnad.
- trombocytopeni (lågt antal blodplättar, vilka är celler som hjälper blodet att levra sig).
- allergiska reaktioner, inklusive allergiska hudreaktioner.
- försämrad leverfunktion (kan ses i prover som tas av läkaren).
- blodtester kan visa en ökning av bilirubin, vissa bukspottkörtel- eller leverenzymmer eller av antalet blodplättar.
- svimning.
- sjukdomskänsla.
- snabbare puls.
- muntorrhet.
- nässelfeber.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

- blödning i en muskel.
- gallstas (minskat gallflöde), hepatit inkl. hepatocellulär skada (inflammerad lever inkl. leverskada).
- gulfärgning av huden och ögonen (gulsot).
- lokal svullnad.
- blodutgjutning (hematom) i lumsken som en komplikation efter ett ingrepp i hjärtat, där en kateter sätts in för att behandla trånga kransartärer i hjärtat (pseudoaneurysm).

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

- ackumulering av eosinofila granulocyter, en typ av vita blodkroppar som orsakar inflammation i lungorna (eosinofil lunginflammation)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

- njursvikt efter en allvarlig blödning.
- blödning i njuren, ibland med förekomst av blod i urinen, vilket leder till att njurarna inte fungerar som de ska (antikoagulantirelaterad nefropati)
- ökat tryck i muskler i ben eller armar efter en blödning, vilket kan leda till smärta, svullnad, ändrad sinnesförmåelse, domning eller förlamning (kompartmentsyndrom efter en blödning).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Rivaroxaban Zentiva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på varje blister efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

PVC/PVdC/Alu blister: Förvaras under 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Alu/Alu blister: Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är rivaroxaban. Varje kapsel innehåller 10 mg rivaroxaban.
- Övriga innehållsämnen är:
Kapselinnehåll: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, hypromellos, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.
Kapselskal: gelatin, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172), svart järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rivaroxaban Zentiva 10 mg kapslar är fyllda med ett vitt till benvitt pulver, har kapselstorlek "3" (ca 16 mm i längd), med beige ogenomskinlig över- och underdel.

De hårda kapslarna är förpackade i blister av PVC/PVdC/Alu eller Alu/Alu.

Rivaroxaban Zentiva 10 mg finns i förpackningar med 5, 10, 15, 20, 30 och 100 hårda kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Zentiva, k.s.
U kabelovny 130,
102 37 Prag 10,
Tjeckien

Tillverkare

ZENTIVA SA
B-dul Theodor Pallady nr.50, sektor 3,
București, cod 032266,
Rumänien

ELLER

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park,
Paola, PLA3000, Malta

Lokal företrädare

Zentiva Denmark ApS
Fuglevangsvej 11
DK-1962 Frederiksberg
Info.nordcs@zentiva.com

Denna bipacksedel ändrades senast 2025-06-27.