

Bipacksedel: Information till användaren

Strifus 20 mg/g kräm

fusidinsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Strifus kräm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Strifus kräm
3. Hur du använder Strifus kräm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Strifus kräm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Strifus kräm är och vad det används för

Strifus kräm innehåller en typ av antibiotikum som kallas fusidinsyra och som verkar mot bakterier som kan orsaka hudinfektioner.

Du kan använda Strifus kräm på infektioner orsakade av bakterier som är känsliga för fusidinsyra och då det er lämpligt med lokal behandling.

Fusidinsyra som finns i Strifus kräm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Strifus kräm

Använd inte Strifus kräm

- om du är allergisk mot fusidinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Strifus kräm.

Var försiktig så att Strifus kräm inte kommer i ögonen om du använder den i ansiktet, eftersom det kan orsaka irritation.

Andra läkemedel och Strifus kräm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet: Inga skadliga effekter på fostret har observerats.

Amning: Fusidinsyra påverkar troligen inte barn som ammas vid utvärtes användning då den systemiska exponeringen av fusidinsyra/natriumfusidat i den ammande kvinnan är försumbar. Produkten kan användas vid amning, dock ska applicering kring bröstvårtan undvikas.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på körförmåga och användning av maskiner.

Strifus kräm innehåller cetylalkohol, butylhydroxianisol, kaliumsorbat och polysorbat.

- Cetylalkohol och kaliumsorbat kan ge lokala hudreaktioner (t. ex. kontakteksem).
- Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t. ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.
- Polysorbat kan orsaka allergiska reaktioner.

3. Hur du använder Strifus kräm

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur du använder Strifus kräm

Detta läkemedel är endast avsett för användning på huden, hos dig eller hos ett barn. Det får inte sväljas. Tvätta alltid händerna före användning av Strifus kräm.

Ta av locket. Kontrollera att förseglingen inte är bruten innan du använder krämen för första gången. Tryck därefter spetsen i locket genom förseglingen i tuben.

Stryk ut krämen försiktigt på huden. Om din läkare har sagt att du ska använda krämen i ansiktet, var mycket försiktig så att den inte kommer i ögonen. Om du av misstag får kräm i ögonen, skölj genast med kallt vatten. Skölj därefter ögat med ögonsköljning om möjligt. Det kan svida i ögat.

Om du inte använder krämen för att behandla dina händer, ska du alltid tvätta händerna efter att du har använt Strifus kräm.

Hur mycket Strifus kräm du ska använda

Din läkare kommer att tala om hur mycket Strifus kräm du ska använda.

Den vanliga behandlingstiden är upp till två veckor. Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel under en längre tid.

Applicera krämen på det infekterade hudområdet. Vanligtvis behöver du göra detta två till tre gånger om dagen, men mer sällan om området täcks med ett plåster eller bandage.

Du bör märka att huden blir bättre redan efter några dagars behandling. Om det inte har skett någon förbättring efter sju dagar, ska du sluta använda krämen och kontakta läkare.

Om du har använt för stor mängd av Strifus

Det är inte troligt att överdosering förekommer. Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Strifus kräm

Om du har glömt att använda Strifus kräm applicera det så snart du kommer ihåg det. Använd sedan läkemedlet vid nästa vanliga tidpunkt.

Om du slutar att använda Strifus

Strifus är ett antibiotikum. Det är viktigt att du fortsätter att använda läkemedlet så länge som läkaren har rekommenderat.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

I kliniska prövningar fick cirka 2 av 100 patienter en biverkning. De vanligaste biverkningarna är icke allvarliga hudproblem där krämen har använts, och dessa förekommer hos cirka 1 av 100 patienter.

Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:

Du måste omedelbart söka akut medicinsk hjälp om du får något av följande symtom. Du kan ha en allergisk reaktion. Detta är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

- **Du får andningssvårigheter.**
- **Dina läppar eller din mun börjar sticka eller svullna.**
- **Ditt ansikte eller hals svullnar.**
- **Du får ett allvarligt hudutslag.**

Andra möjliga biverkningar som också kan förekomma:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Hudutslag eller klåda
- Hudrodnad
- Klåda, rodnad, värmekönsla och svullnad vid behandlingsstället (kontaktdermatit eller eksem)
- Smärta, irritation (sveda) eller brännande känsla vid behandlingsstället.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

- Ögat kan bli mycket irriterat, klia och rinna
- Svullnad i ansikte, läppar, mun, hals eller tunga som kan orsaka sväljsvårigheter eller andningsbesvär.
- Nässelutslag eller blåsor

Dessa biverkningar kan också förekomma hos barn som använder produkten.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Strifus kräm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvarningsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Tuben ska kasseras 28 dagar efter första öppnandet. Skriv datumet då du öppnade tuben i avsett utrymme på kartongen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är fusidinsyra. Ett gram innehåller fusidinsyrahemihydrat motsvarande 20 mg fusidinsyra.
- Övrigt innehållsämnen är: butylhydroxianisol (E320), cetylalkohol, glycerol (85%), flytande paraffin, polysorbat 60 (E 435), kaliumsorbat (E 202), renat vatten, vitt vaselin, saltsyra (för justering av pH värdet).

Du hittar viktig information om vissa av innehållsämnen i din medicin i slutet av avsnitt 2 i denna bipacksedel under rubriken Strifus kräm innehåller cetylalkohol, butylhydroxianisol, kaliumsorbat och polysorbater.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Strifus är en vit, slät och homogen kräm. Den finns i tuber om 15 g och 30g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Strides Nordic ApS,
Fuglevangsvej 11
1962 Frederiksberg C,
Danmark

Tillverkare

Beltapharm S.P.A
Via Stelvio, 66
20095 Cusano Milanino (MI)
Italien

Misom Labs Ltd
Malta Life Sciences Park, LS2.01.06 Industriområde,
San Gwann SGN 3000, Malta

Denna bipacksedel ändrades senast 2026-01-10