

Bipacksedel: Information till användaren

Sunitinib Teva 12,5 mg hårda kapslar

Sunitinib Teva 25 mg hårda kapslar

Sunitinib Teva 37,5 mg hårda kapslar

Sunitinib Teva 50 mg hårda kapslar

sunitinib

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

- Vad Sunitinib Teva är och vad det används för
- Vad du behöver veta innan du använder Sunitinib Teva
- Hur du använder Sunitinib Teva
- Eventuella biverkningar
- Hur Sunitinib Teva ska förvaras
- Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Sunitinib Teva är och vad det används för

Sunitinib Teva innehåller den aktiva substansen sunitinib, som är en proteinkinashämmare. Det används vid behandling av cancer för att hindra aktiviteten hos en viss typ av proteiner som man vet är verksamma vid tillväxt och spridning av cancerceller.

Sunitinib Teva används för att behandla vuxna med följande cancerformer:

- Gastrointestinal stromacellstumör (GIST), en typ av cancer i magsäcken och tarmarna. Sunitinib Teva används om imatinib (ett annat cancerläkemedel) inte längre har någon verkan eller om du inte kan ta imatinib.
- Metastaserad njurcellscancer (MRCC), en typ av njurcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.
- Neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET) (tumör i de hormonproducerande cellerna i bukspottkörteln), när canceren har förvärrats eller inte kan opereras.

Om du undrar över hur Sunitinib Teva verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats till dig, kontakta läkaren.

Sunitinib som finns i Sunitinib Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Sunitinib Teva

Använd INTE Sunitinib Teva

- om du är allergisk mot sunitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Sunitinib Teva:

- **Om du har högt blodtryck.** Sunitinib Teva kan höja blodtrycket. Din läkare kan vilja kontrollera ditt blodtryck under behandlingen med Sunitinib Teva och du får eventuellt behandling för att sänka blodtrycket, om det skulle behövas.
- **Om du har eller har haft någon blodsjukdom, problem med blödningar eller blåmärken.** Behandling med Sunitinib Teva kan leda till högre blödningsrisk eller en förändring i antalet av vissa celler i blodet, vilket kan ge anemi (blodbrist) eller påverka blodets förmåga att leveras. Om du tar läkemedel som tunnar ut blodet för att förhindra blodproppar, t.ex. warfarin eller acenokumarol, kan blödningsrisken vara förhöjd. Tala om för din läkare om du får en blödning när du behandlas med Sunitinib Teva.
- **Om du har problem med hjärtat.** Sunitinib Teva kan orsaka hjärtproblem. Tala om för din läkare om du känner dig väldigt trött, är andfådd eller har svullna fötter och fotleder.
- **Om hjärtrytmen blir onormal.** Sunitinib Teva kan ge onormal hjärtrytm. Din läkare kan ta ett EKG för att bedöma dessa problem under behandlingen med Sunitinib Teva. Berätta för din läkare om du känner dig yr, svimfärdig eller får onormala hjärtslag när du tar Sunitinib Teva.
- **Om du nyligen haft problem med blodproppar i vener och/eller artärer (olika typer av blodkärl), inklusive stroke, hjärtinfarkt, embolism eller trombos.** Kontakta din läkare omedelbart om du känner några symtom som bröstsmärtor eller tryck över bröstet, smärtor i armarna, ryggen, halsen eller käken, andfåddhet, domningar eller svaghet i ena kroppshalvan, problem att tala, huvudvärk eller yrsel medan du behandlas med Sunitinib Teva.
- **Om du har eller har haft en aneurysm** (förstoring och försvagning av en kärlvägg) eller en bristning i en kärlvägg.
- **Om du har eller har haft skador i de minsta blodkärlen, vilket kallas för trombotisk mikroangiopati (TMA).** Tala om för din läkare om du får feber, utmattning, trötthet, blåmärken, blödning, svullnad, förvirring, synbortfall och krampanfall.
- **Om du har problem med sköldkörteln.** Sunitinib Teva kan orsaka problem med sköldkörteln. Tala om för din läkare om du lättare blir trött, fryser mer än andra eller om din röst blir djupare när du tar Sunitinib Teva. Sköldkörtelfunktionen bör kontrolleras innan du tar Sunitinib Teva och regelbundet medan du tar det. Om din sköldkörtel inte producerar tillräckligt mycket sköldkörtelhormon kan du få behandling med sköldkörtelhormonersättning.
- **Om du har eller har haft någon sjukdom i bukspottkörteln eller gallblåsan.** Tala om för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom: smärtor i området runt magsäcken (övre delen av buken), illamående, kräkningar och feber. Dessa kan vara orsakade av en inflammation i bukspottkörteln eller gallblåsan.
- **Om du har eller har haft problem med levern.** Tala om för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom på leverproblem under behandlingen med Sunitinib Teva: klåda, gulfärgning av ögon eller hud, mörk urin och smärtor eller obehag i övre högra delen av buken. Din läkare bör ta blodprover för att kontrollera leverfunktionen före och under behandlingen med Sunitinib Teva, efter behov.
- **Om du har eller har haft problem med njurarna.** Din läkare kommer att övervaka din njurfunktion.

- **Om du ska opereras eller nyligen har opererats.** Sunitinib Teva kan påverka sår läkningen. Oftast slutar man använda Sunitinib Teva före en operation. Din läkare avgör när du kan börja ta Sunitinib Teva igen.
- **Du kan rekommenderas att göra en kontroll hos tandläkaren innan du börjar behandlingen med Sunitinib Teva.**
 - Om du har eller har haft ont i munnen, tänderna och/eller käken, svullnader eller sår i munnen, om du känner en domning eller tyngdkänsla i käken, eller om en tand lossnar - kontakta läkare och tandläkare **omedelbart**.
 - Om du behöver genomgå en invasiv tandbehandling eller tandkirurgi ska du tala om för tandläkaren att du behandlas med Sunitinib Teva, särskilt om du även får eller har fått bisfosfonater intravenöst (i ett kärl). Bisfosfonater används för att förhindra skelettkomplikationer och kan ha getts till dig för att behandla en annan åkomma.
- **Om du har eller har haft problem med huden och subkutana vävnaden.** När du tar detta läkemedel, kan tillståndet "pyoderma gangrenosum" (smärtsamma sår på huden) eller "nekrotiserande fasciit" (snabbt förlöpande infektion i hud/mjukdelar som kan vara livshotande) uppkomma. Kontakta omedelbart läkare om du får symtom på infektion runt en skada på huden, inklusive feber, smärta, rodnad, svullnad, eller om var eller blod sipprar ut från såret. Denna biverkning försvinner oftast när behandlingen med sunitinib avslutas. Svåra hudutslag (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, *erythema multiforme*) har rapporterats vid behandling med sunitinib. Dessa uppstår initialt som rödaktiga, cirkulära, måltavleliknande fläckar eller som runda fläckar med en central blåsa, på bålen. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning eller fjällning av huden och kan vara livshotande. Om du får hudutslag eller dessa hudsymtom, ska du **omedelbart** vända dig till läkare.
- **Om du har eller har haft kramper.** Meddela din läkare snarast om du får högt blodtryck, huvudvärk eller synförluster.
- **Om du har diabetes.** Hos diabetespatienter bör blodsockernivåerna kontrolleras regelbundet för att avgöra om doseringen av diabetesläkemedlen behöver justeras. Detta för att minimera risken för lågt blodsocker. Meddela din läkare så snart som möjligt om du upplever några tecken och symtom på lågt blodsocker (trötthet, hjärklappning, svettningar, hunger och medvetlöshet).

Barn och ungdomar

Sunitinib Teva rekommenderas inte till personer under 18 år.

Andra läkemedel och Sunitinib Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Somliga läkemedel kan påverka koncentrationen av Sunitinib Teva i kroppen. Tala om för läkaren om du använder läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

- ketokonazol, itrakonazol – för behandling av svampinfektioner
- erytromycin, klaritromycin, rifampicin – för behandling av infektioner
- ritonavir - för behandling av HIV
- dexametason – en kortikosteroid som används vid olika sjukdomstillstånd (såsom allergier/andningsbesvär eller hudsjukdomar)
- fenytoin, karbamazepin, fenobarbital - för behandling av epilepsi och andra neurologiska tillstånd
- traditionella växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (*Hypericum perforatum*) - används vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Sunitinib Teva med mat och dryck

Undvik att dricka grapefruktjuice medan du behandlas med Sunitinib Teva.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om det finns risk att du blir gravid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med Sunitinib Teva.

Om du ammar, tala med läkaren. Du bör inte amma under tiden då du behandlas med Sunitinib Teva.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig yr eller ovanligt trött, var särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Sunitinib Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

3. Hur du använder Sunitinib Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Läkaren kommer att ordinera en lämplig dos för dig, beroende på vilken typ av cancer du har. Om du behandlas för:

- GIST eller njurcancer (MRCC) är den vanligaste dosen 50 mg en gång dagligen, som tas i 28 dagar (fyra veckor), följt av 14 dagars (två veckors) uppehåll (utan medicin), i 6-veckorsperioder.
- pNET är den vanliga dosen 37,5 mg en gång dagligen utan något uppehåll.

Läkaren avgör vilken dos som är lämplig för dig, och när och om du behöver sluta med Sunitinib Teva.

Sunitinib Teva kan tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Sunitinib Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta **omedelbart** läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan behöva läkartillsyn.

Om du har glömt att ta Sunitinib Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du måste **omedelbart** kontakta din läkare om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar (se även **Vad du behöver veta innan du använder Sunitinib Teva**):

Hjärtproblem. Tala om för din läkare om du känner dig mycket trött, andfådd, eller har svullna fötter och fotleder. Detta kan vara symtom på hjärtproblem som hjärtsvikt och problem med hjärtmuskeln

(kardiomyopati).

Problem med lungor eller andning. Tala om för din läkare om du får hosta, smärtor i bröstet, plötslig andfåddhet eller om du hostar blod. Detta kan vara symtom på lungemboli som uppstår när blodproppar förs till lungorna.

Njursjukdomar. Tala om för din läkare om du märker några förändringar i hur ofta du kissar eller om du inte kissar. Detta kan vara symtom på njursvikt.

Blödning. Tala om för din läkare om du får något av dessa symtom eller om du får en allvarlig blödning under behandlingen med Sunitinib Teva: smärtande och svullen buk, kräkningar med blod, svart och klibbig avföring, blod i urinen, huvudvärk, förändrat medvetande- eller sinnestillstånd eller upphostningar av blod eller blodigt slem från lungorna eller luftvägarna.

Tumörnedbrytning som leder till hål i tarmen. Tala om för din läkare om du får svåra buksmärtor, feber, illamående, kräkningar, blod i avföringen eller förändrade avföringsvanor.

Andra biverkningar som kan uppträda med Sunitinib Teva är:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

- Sänkt antal blodplättar, röda blodkroppar och/eller vita blodkroppar (t.ex. neutrofiler)
- Andfåddhet
- Högt blodtryck
- Extrem trötthet, kraftlöshet
- Svullnad på grund av vätskeansamling under huden och runt ögonen, djupt allergiskt utslag
- Smärta/irritation i munnen, munsår, inflammation i munnen, muntorrhet, smakstörningar, orolig mage, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, buksmärtor/-svullnad, nedsatt aptit
- Minskad aktivitet i sköldkörteln (hypotyroidism)
- Yrsel
- Huvudvärk
- Näsblod
- Ryggsmärtor, smärta i lederna
- Smärtor i armar och ben
- Gulfärgad eller missfärgad hud, ökad pigmentering av huden, förändrad hårfärg, utslag i handflatorna och på fotsulorna, hudutslag, torr hud
- Hosta
- Feber
- Svårigheter att somna.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

- Proppar i blodkärlen
- Bristande blodförsörjning till hjärtmuskeln på grund av tilltäppning eller förträngning av hjärtats kranskärl
- Bröstsmärtor
- Minskning av den mängd blod som hjärtat pumpar
- Vätskeansamling runt lungorna
- Infektioner
- Komplikation av svår infektion (infektion i blodet) som kan leda till vävnadsskada, organsvikt och död
- Sänkt blodsockernivå (se avsnitt 2)
- Proteinläckage i urinen som ibland leder till svullnad
- Influensaliknande symptom
- Onormala blodvärden, bl.a. för bukspottkörtel- och leverenzymerna
- Ökad nivå av urinsyra i blodet
- Hemorroider, smärtor i ändtarmen, blödningar i tandköttet, svårigheter eller oförmåga att svälja

- Brännande känsla eller smärtor på tungan, inflammation i magtarmkanalens slemhinna, ökad mängd gas i magsäck eller tarm
- Viktnedgång
- Muskuloskeletal smärta (smärta i muskler och skelett), muskelsvaghet, muskeltrötthet, muskelsmärta, muskelspasm
- Torrhet i näsan, nästäppa
- Ökat tårflöde
- Onormal känslighet i huden, klåda, fjällande och inflammerad hud, blåsor, acne, missfärgning av naglarna, håravfall
- Onormal känsla i armar och ben
- Onormalt minskad eller ökad känslighet, speciellt för beröring
- Halsbränna
- Uttorkning
- Blodvallningar
- Missfärgad urin
- Depression
- Frossa.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

- Livshotande infektion i mjukdelar, även runt ändtarm och könsorgan (se avsnitt 2)
- Stroke
- Hjärtinfarkt orsakad av avbruten eller minskad blodförsörjning till hjärtat
- Förändringar i hjärtats elektriska aktivitet eller onormal hjärtrytm
- Vätska runt hjärtat (perikardiell utgjutning)
- Leversvikt
- Buksmärta förorsakade av inflammation i bukspottkörteln
- Tumörnedbrytning som leder till hål i tarmen (perforation)
- Inflammation (svullnad och rodnad) i gallblåsan, med eller utan gallsten
- Onormal kanal från en normal kroppshålighet till en annan eller till huden (fistel)
- Smärta i munnen, tänderna och/eller käken, svullnad och sår inne i munnen, domningar eller en tyngdkänsla i käken, eller tandlossning. Detta kan vara symtom på skelettskada i käken (osteonekros), se avsnitt 2.
- Överproduktion av sköldkörtelhormon, vilket ökar kroppens energiförbrukning i vila
- Problem med sårhäkning efter kirurgi
- Ökad halt av muskelenzym (kreatinfosfokinas) i blodet
- Stark reaktion på någon allergen inklusive hösnuva, hudutslag, klåda, nässelfeber, svullnad av kroppsdelar och svårigheter att andas
- Inflammation i tjocktarmen (kolit, ischemisk kolit).

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

- Svåra reaktioner på huden och/eller slemhinnorna (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, erythema multiforme)
- Tumörlyssyndrom (TLS) – TLS är en grupp av komplikationer som rör ämnesomsättningen och som kan uppträda vid cancerbehandling. Dessa komplikationer orsakas av nedbrytningsprodukter från döende cancerceller och symtomen kan vara följande: illamående, andfåddhet, oregelbunden puls, muskelkramper, krampanfall, grumlig urin och trötthet sammantaget med onormala laboratorievärden (höga kalium-, urinsyra- och fosfatnivåer och låga kalciumnivåer i blodet). Komplikationerna kan leda till förändrad njurfunktion och akut njursvikt.
- Onormal nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan leda till njurproblem (rabdomyolys)
- Onormala förändringar i hjärnan, vilket kan orsaka ett antal symtom, inkluderande huvudvärk, förvirring, kramper och synbortfall (reversibelt posterioort leukoencefalopatisyndrom)
- Smärtsamma sår på huden (pyoderma gangrenosum)
- Inflammation i levern (hepatit)
- Inflammation i sköldkörteln

- Skador på de minsta blodkärlen, vilket kallas för trombotisk mikroangiopati (TMA).

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare

- En förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och arteriella dissektioner).
- Brist på energi, förvirring, dåsighet, medvetslöshet/koma – dessa symtom kan vara tecken på hjärntoxicitet orsakat av höga nivåer av ammoniak i blodet (hyperammonemisk encefalopati).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Sunitinib Teva ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
- Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller verkar ha öppnats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Sunitinib Teva 12,5 mg hårda kapslar

Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller 12,5 mg sunitinib.

Övriga innehållsämnen är:

- *Kapselinnehåll:* mannitol, povidon K-25, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.
- *Kapselskal:* gelatin, titandioxid (E171), röd och gul järnoxid (E172).
- *Trycksvärta:* shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol, koncentrerad ammoniak, kaliumhydroxid.

Sunitinib Teva 25 mg hårda kapslar

Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller 25 mg sunitinib.

Övriga innehållsämnen är:

- *Kapselinnehåll:* mannitol, povidon K-25, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.
- *Kapselskal:* gelatin, titandioxid (E171), röd och gul järnoxid (E172).
- *Trycksvärta:* shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol, koncentrerad ammoniak, kaliumhydroxid.

Sunitinib Teva 37,5 mg hårda kapslar

Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller 37,5 mg sunitinib.

Övriga innehållsämnen är:

- *Kapselinnehåll:* mannitol, povidon K-25, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.
- *Kapselskal:* gelatin, titandioxid (E171) och gul järnoxid (E172).

- *Trycksvärta*: shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol, koncentrerad ammoniak, kaliumhydroxid.

Sunitinib Teva 50 mg hårda kapslar

Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller 50 mg sunitinib.

Övriga innehållsämnen är:

- *Kapselinnehåll*: mannitol, povidon K-25, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.
- *Kapselskal*: gelatin, titandioxid (E171), röd och gul järnoxid (E172).
- *Trycksvärta*: shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol, koncentrerad ammoniak, kaliumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sunitinib Teva 12,5 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel med mellanorange ogenomskinligt lock och mellanorange ogenomskinlig underdel märkt med "12,5" i svart tryckfärg på locket. Varje kapsel av storlek 4 (total längd på stängd kapsel cirka 14,2 mm) innehåller ett orange granulerat pulver.

Sunitinib Teva 25 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel med ljusorange ogenomskinligt lock och mellanorange ogenomskinlig underdel märkt med "25" i svart tryckfärg på locket. Varje kapsel av storlek 3 (total längd på stängd kapsel cirka 15,8 mm) innehåller ett orange granulerat pulver.

Sunitinib Teva 37,5 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel med kraftigt gult ogenomskinligt lock och kraftigt gul ogenomskinlig underdel märkt med "37,5" i svart tryckfärg på locket. Varje kapsel av storlek 2 (total längd på stängd kapsel cirka 17,6 mm) innehåller ett orange granulerat pulver.

Sunitinib Teva 50 mg hårda kapslar

Hård gelatinkapsel med ljusorange ogenomskinligt lock och ljusorange ogenomskinlig underdel märkt med "50" i svart tryckfärg på locket. Varje kapsel av storlek 2 (total längd på stängd kapsel cirka 17,6 mm) innehåller ett orange granulerat pulver.

Förpackningsstorlekar

Sunitinib Teva tillhandahålls i HDPE-burkar med 30 kapslar och blisterförpackningar med 28 och 30 kapslar samt endosblisterförpackningar med 28 x 1 och 30 x 1 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederländerna

Tillverkare:

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Polen

Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Strasse 3
89143 Blaubeuren
Tyskland

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)
Prilaz baruna Filipovića 25
10000 Zagreb
Kroatien

Actavis International Ltd.
4 Sqaq tal-Gidi off Valletta Road
Luqa LQA 6000
Malta

Balkanpharma Dupnitsa AD
3 Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bulgarien

Denna bipacksedel ändrades senast 2024-07-24