

Bipacksedel: Information till patienten

Symbicort 80 mikrogram/2,25 mikrogram/puff inhalationsspray, suspension

budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Symbicort är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Symbicort
3. Hur du använder Symbicort
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Symbicort ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Symbicort är och vad det används för

Vad Symbicort är

Symbicort är en inhalator som används för att behandla astma hos vuxna och ungdomar i åldern 12–17 år. Den innehåller två olika läkemedel: budesonid och formoterolfumaratdihydrat.

- Budesonid tillhör en grupp läkemedel som kallas ”kortikosteroider”.
- Formoterolfumaratdihydrat tillhör en grupp läkemedel som kallas ”långverkande beta₂-adrenoreceptoragonister” eller ”luftrörsvidgare”.

Budesonid och formoterolfumaratdihydrat som finns i Symbicort kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad Symbicort används för att behandla

Symbicort används för att behandla astma och kan förskrivas ensamt eller med en anfallskuperare (luftrörsvidgare som tas vid behov).

Vissa personer får två astmainhalatorer förskrivna: Symbicort inhalator och en separat ”anfallskuperare”

- De använder Symbicort varje dag, vilket hjälper till att förhindra uppkomsten av astmasymtom.
- De använder sin ”anfallskuperare” när de får astmasymtom för att göra det lättare att andas igen.

Vissa personer får Symbicort förskrivet som sin enda astmainhalator

- De använder Symbicort varje dag, vilket hjälper till att förhindra uppkomsten av astmasymtom.
- De använder även Symbicort när de behöver extra doser för att behandla astmasymtom och göra det lättare att andas igen och, om överenskommet med läkaren, även för att förebygga uppkomsten av astmasymtom (t.ex. när de tränar eller utsätts för allergiframkallande ämnen). De behöver inte en separat inhalator för detta.

Hur Symbicort verkar

- Budesonid verkar genom att minska och förebygga svullnad och inflammation i lungorna.
- Formoterolfumaratdihydrat verkar genom att få musklerna i dina luftvägar att slappna av, vilket hjälper dig att andas lättare.

2. Vad du behöver veta innan du använder Symbicort

Använd inte Symbicort

- om du är allergisk mot budesonid, formoterol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Symbicort om:

- Du har diabetes.
- Du har en lunginfektion.
- Du har högt blodtryck eller om du någonsin har haft hjärtproblem (inkluderande ojämn hjärtrytm, väldigt snabb puls, förträngning i artärerna eller hjärtsvikt).
- Du har problem med sköldkörteln eller med binjurarna.
- Du har låga halter kalium i blodet.
- Du har svåra leverproblem.

Tala med läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbingar när du använder Symbicort.

Barn

Använd inte detta läkemedel till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Symbicort

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Framför allt bör du tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder något av följande läkemedel:

- Betablockerare mot högt blodtryck såsom atenolol eller propranolol.
- Ögondroppar - såsom timolol mot grön starr.
- Läkemedel mot snabb eller oregelbunden hjärtrytm - såsom kinidin.
- Läkemedel som digoxin - används ofta för att behandla hjärtsvikt.
- Vätskedrivande läkemedel (diuretika) mot högt blodtryck - såsom furosemid.
- Steroider som tas via munnen - såsom prednisolon.
- Xantiner - såsom teofyllin eller aminofyllin. Dessa används ofta för att behandla astma.
- Andra luftvägsvidgande läkemedel - såsom salbutamol.
- Antidepressiva läkemedel - såsom amitriptylin och nefazodon.
- Fentiaziner - såsom klorpromazin och proklorperazin.
- Läkemedel mot HIV-infektioner - såsom ritonavir.
- Läkemedel mot infektioner - såsom ketokonazol, itraconazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycin och telitromycin.
- Läkemedel mot Parkinsons sjukdom - såsom levodopa.
- Läkemedel mot sköldkörtelproblem - såsom levotyroxin.

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du känner dig osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Symbicort.

Om du kommer att behöva narkos i samband med en operation eller ett tandingrepp, ska du också berätta detta för läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

- Om du är gravid eller planerar graviditet, rådfråga läkare innan du använder Symbicort - använd inte Symbicort om inte din läkare råder dig till detta.

- Om du blir gravid under tiden som du använder Symbicort ska du inte sluta att använda Symbicort, men omedelbart kontakta din läkare.
- Om du ammar, rådfråga din läkare innan du använder Symbicort.

Körförmåga och användning av maskiner

Symbicort har ingen eller försumbar effekt på din förmåga att köra bil eller använda redskap eller maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Symbicort

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- Det är viktigt att använda Symbicort varje dag, även om du just då inte har några symtom på astma.
- Din läkare kommer att kontrollera dina astmasymtom regelbundet.
- Din läkare kan överväga att lägga till steroidtabletter till din vanliga behandling under stressiga perioder (till exempel om du har en luftvägsinfektion eller före en operation).

Symbicort kan förskrivas som ensam behandling mot astma eller tillsammans med en anfallskuperare. Du behöver ta två puffar (inhalationer) av Symbicort för att få en hel dos. Mängden Symbicort som ska användas och när den ska användas beror på hur läkemedlet har förskrivits till dig.

- a) Om du har fått Symbicort och en separat anfallskuperare förskrivna, läs avsnittet som heter "a) Att använda Symbicort och en separat anfallskuperare".
- b) Om du har fått Symbicort förskrivet som din enda inhalator, läs avsnittet som heter "b) Att använda Symbicort som din enda astmainhalator".

a) Att använda Symbicort och en separat "anfallskuperare"

Använd Symbicort varje dag. Detta hjälper till att förebygga uppkomsten av astmasymtom.

Vuxna (18 år och äldre)

- Vanlig dos är 2-4 puffar, två gånger om dagen.
- Din läkare kan öka detta till 8 puffar, två gånger om dagen.
- Om astmasymtomen kontrolleras väl kan din läkare be dig att ta läkemedlet en gång om dagen.

Ungdomar (12 till 17 år)

- Vanlig dos är 2-4 puffar, två gånger om dagen.
- Om astmasymtomen kontrolleras väl kan din läkare be dig att ta läkemedlet en gång om dagen.

Din läkare (eller astmasköterska) kommer att hjälpa dig att hantera din astma. De kommer att anpassa dosen av läkemedlet till den lägsta dos som behövs för att kontrollera astman. Justera inte dosen och sluta inte med behandlingen utan att tala med läkare (eller astmasköterska) först

Använd din separata anfallskuperare för att behandla astmasymtom när de uppträder.

- Ha alltid med dig din anfallskuperare så du kan använda den när du behöver.
- Använd inte Symbicort för att behandla dina astmaanfall – använd din anfallskuperare.

b) Att använda Symbicort som din enda astmainhalator.

Använd endast Symbicort på det här sättet om din läkare sagt att du ska göra det och endast om du är 12 år eller äldre.

Använd din Symbicort varje dag. Detta hjälper till att förebygga uppkomsten av astmasymtom. Du kan ta något av följande:

- 2 puffar på morgonen och 2 puffar på kvällen
- 4 puffar på morgonen
- 4 puffar på kvällen

Din läkare kan öka detta till 4 puffar två gånger om dagen.

Använd även Symbicort som en ”anfallskuperare” för att behandla astmasymtom när de uppträder och för att förebygga uppkomsten av astmasymtom (till exempel när du tränar eller utsätts för allergiframkallande ämnen).

- Om du får astmasymtom, ta 2 puffar och vänta i några minuter.
- Om du inte känner dig bättre, ta ytterligare 2 puffar.
- Ta inte fler än 12 puffar vid ett och samma tillfälle.

Ha alltid din Symbicort inhalator med dig så att du kan använda den när du behöver.

En total daglig dos om fler än 16 puffar behövs normalt inte. Din läkare kan dock säga åt dig att ta upp till 24 puffar per dag under en begränsad period.

Om du regelbundet behöver 16 puffar eller fler under en dag, besök din läkare eller sjuksköterska. De kan behöva förändra din behandling.

Använd inte fler än 24 puffar på 24 timmar.

Om du tränar och får astmasymtom, använd Symbicort enligt beskrivningen här. Det är viktigt att du diskuterar användningen av Symbicort med din läkare för att förebygga att astmasymtom uppträder. Hur ofta du tränar och hur ofta du utsätts för allergiframkallande ämnen kan påverka behandlingen som förskrivs till dig.

Symbicort och steroidtabletter

Om du har tagit steroidtabletter mot astma kan läkaren minska antalet tabletter som du ska ta när du börjat ta Symbicort. Om du har tagit steroidtabletter under lång tid kan läkaren vilja ta blodprover då och då. När du minskar på antalet steroidtabletter kan du må allmänt sämre även om dina symtom från bröstet förbättras. Symtomen kan inkludera:

- nästäppa eller snuva
- svaghet
- led- eller muskelsmärta
- utslag (eksem)

Kontakta omedelbart läkare om du får symtom som:

- huvudvärk
- trötthet
- illamående
- kräkningar

Om du får något av symtomen ovan, kontakta genast din läkare. Du kan behöva byta till ett annat läkemedel. Diskutera med läkaren om du är orolig för att fortsätta att använda Symbicort.

Användning för barn

Andra former av detta läkemedel är lämpliga för barn. Tala med läkare eller apotekspersonal.

Viktig information om dina astmasymtom

Om du känner att du blir andfådd eller får pipande andning under tiden som du använder Symbicort ska du fortsätta att använda Symbicort men uppsöka läkare så snart som möjligt, eftersom du kan behöva ytterligare behandling.

Kontakta omedelbart läkare om:

- din andning försämras eller om du ofta vaknar på natten med astmasymtom.
- du börjar känna tryck över bröstkorgen på morgonen eller om trycket över bröstet varar längre än vanligt.
- dessa tecken kan tyda på att din astma inte är tillräckligt under kontroll, och du kan behöva annan eller ytterligare behandling omedelbart.

Information om din Symbicort

- Innan du börjar använda din Symbicort ska du ta ut den ur folieomslaget. Kasta bort omslaget och torkmedlet som finns inuti omslaget. Om torkmedlet har läckt ut ur sin påse ska du inte använda inhalatorn.
- När du har tagit ut inhalatorn ur folieomslaget måste du använda den inom 3 månader. Skriv upp sista förbrukningsdagen (3 månader från det du öppnade omslaget) i det tomma utrymmet på inhalatoretiketten, som en påminnelse om när du ska sluta använda inhalatorn.
- På bilden visas inhalatorns olika delar. Inhalatorn är redan monterad när du får den. Ta inte isär den. Om behållaren skulle lossna, sätter du tillbaka den i inhalatorn och fortsätter att använda inhalatorn.




Förbereda din Symbicort

I följande situationer måste du förbereda din inhalator för användning:

- Om du använder din nya Symbicort för första gången.
- Om du inte har använt den på mer än 7 dagar.
- Om du har tappat den.

För att förbereda inhalatorn för användning, följ instruktionerna nedan:

1. Skaka inhalatorn noga i minst 5 sekunder för att blanda innehållet i aerosolbehållaren.
2. Ta bort locket från munstycket genom att trycka lätt på upphöjningarna på sidan. Remmen till munstyckeslocket kommer sitta kvar på inhalatorn.
3. Håll inhalatorn upprätt. Tryck sedan på räkneverket (på ovansidan av inhalatorn) för att släppa ut en puff i luften. Du kan antingen använda en hand eller båda händerna som visas på bilderna.



4. Ta bort fingret/fingrarna från räkneverket.
5. Vänta i 10 sekunder, skaka noga och upprepa sedan steg 3 och 4.
6. Din inhalator är nu klar att användas.

Hur man inhalar

Varje gång du behöver göra en inhalation, följ instruktionerna nedan:

1. Skaka inhalatorn noga i minst 5 sekunder för att blanda innehållet i aerosolbehållaren.
2. Ta bort locket från munstycket genom att trycka lätt på upphöjningarna på sidan. Kontrollera att munstycket inte är blockerat.

3. Håll inhalatorn upprätt (antingen med ena handen eller med båda händerna). Andas ut försiktigt.
4. Placera försiktigt munstycket mellan tänderna. Slut läpparna.
5. Börja andas in långsamt och djupt genom munnen. Tryck hårt på räkneverket (på ovansidan av inhalatorn) för att släppa ut en puff. Fortsätt att andas in så djupt du kan en kort stund efter att du tryckt på räkneverket. När du andas in samtidigt som du trycker på räkneverket säkerställer du att läkemedlet kommer ner i lungorna.
6. Håll andan i 10 sekunder eller så länge som det känns bra.
7. Innan du andas ut ska du ta bort fingret från räknaren och ta ut inhalatorn ur munnen. Håll inhalatorn upprätt.
8. Andas sedan ut långsamt. För att göra en inhalation till skakar du först inhalatorn noga i minst 5 sekunder och upprepar sedan steg 3 till 7.
9. Sätt tillbaka locket på munstycket.
10. Skölj munnen med vatten efter dina dagliga morgon- och kvälldoser, och spotta ut vattnet.



Användning av andningsbehållare


Läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen kan föreslå att du ska använda en andningsbehållare (t.ex. **AeroChamber Plus Flow Vu** eller **AeroChamber Plus**). Följ anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer andningsbehållaren.

Rengöra din Symbicort


- Torka av insidan och utsidan av munstycket med en torr trasa minst en gång i veckan.
- Använd inte vatten eller andra vätskor.
- Ta inte loss behållaren ur inhalatorn.

Hur vet jag när jag ska byta ut min Symbicort?


- Räkneverket på ovansidan av inhalatorn talar om hur många puffar (inhalationer) som finns kvar i din Symbicort. När den är full, visar räkneverket utgångsvärdet 60 eller 120 puffar.



- Varje gång du gör en inhalation eller släpper ut en puff i luften räknar pilen ner ett steg mot noll ("0").
- När pilen börjar komma in i det gula området, betyder det att du har cirka 20 puffar kvar.



- När pilen når "0" måste du sluta använda din Symbicort. Det kan hända att inhalatorn inte känns tom, och det kan verka som om den fortfarande fungerar. Men du får inte rätt mängd läkemedel om du fortsätter att använda den.



Om du använt för stor mängd av Symbicort

Det är viktigt att du tar dosen som det står på apoteketiketten på förpackningen eller som din läkare informerat dig om. Överskrid inte dosen utan att kontakta läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan få följande symtom: diarré, huvudvärk och snabb hjärtrytm.

Om du har glömt att använda Symbicort

- Om du glömmar att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan skulle vara dags för nästa dos, hoppa du däremot helt över den bortglömda dosen.
- Ta **inte** dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Symbicort

Innan du slutar att använda Symbicort måste du tala med läkare eller apotekspersonal. Om du slutar att använda Symbicort kan tecknen och symtomen på astma förvärras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om något av följande händer, sluta att använda Symbicort och kontakta omedelbart läkare:

- Svullnad av ansiktet, framför allt runt munnen (tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja), hudutslag eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter (angioödem) och/eller en plötslig svimningskänsla. Detta kan betyda att du fått en allergisk reaktion. Detta är sällsynt, det förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare.
- Plötslig, akut pipande andning eller andnöd omedelbart efter att du använt din Symbicort inhalator. Om något av dessa symtom uppträder, sluta genast att använda Symbicort och använd din ”anfallskuperare” om den är tillgänglig. Kontakta omedelbart läkare eftersom du kan behöva ändra din behandling. Detta är mycket sällsynt, det förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare.

Övriga eventuella biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- Hjärtklappning, darrningar eller skakningar. Om dessa effekter uppstår är de vanligen milda och försvinner när du fortsätter att använda Symbicort.
- Torsk (en svampinfektion) i munnen. Det är mindre troligt att det här uppstår om du sköljer munnen med vatten efter att du använt din Symbicort morgon och kväll.
- Lite ont i halsen, hosta och hes röst.
- Huvudvärk

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- Känsla av rastlöshet, nervositet eller upprördhet.
- Störd sömn
- Yrsel
- Illamående
- Snabb hjärtrytm
- Blåmärken på huden
- Muskelkramper
- Dimsyn

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

- Utslag, klåda.
- Kramp i luftvägarna (sammandragning av musklerna i luftvägarna, vilket orsakar pipande andning). Om den pipande andningen uppstår plötsligt efter användning av Symbicort ska du sluta använda Symbicort och omedelbart kontakta läkare.
- Låga halter kalium i blodet.
- Ojämn hjärtrytm.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

- Depression
- Beteendeförändringar, speciellt hos barn.
- Bröstmärta eller tryck över bröstet (kärlkramp).
- En ökad mängd socker (glukos) i blodet.
- Smakförändringar, såsom en obehaglig smak i munnen.
- Förändringar av blodtrycket.

Kortikosteroider som inhaleras kan påverka den normala produktionen av steroidhormoner i kroppen, framför allt om du använder höga doser under en lång tid. Effekterna kan vara:

- Förändringar i bentätheten (uttunning av skelettet).
- Grå starr (grumling av ögats lins).
- Grön starr (ökat tryck i ögat).
- Tillväxthämning hos barn och ungdomar.
- Påverkan på binjurarna (en liten körtel som sitter bredvid njuren).

Sannolikheten för att dessa effekter ska inträffa är mycket mindre för inhalede kortikosteroider än för kortikosteroidtablett.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Symbicort ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen och folieomslaget efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- När du har tagit ut inhalatorn ur folieomslaget måste du använda den inom 3 månader. Skriv upp sista förbrukningsdagen (3 månader från det du öppnade omslaget) i det tomma utrymmet på inhalatoretiketten, som en påminnelse om när du ska sluta använda inhalatorn.
- Som med de flesta läkemedel för inhalering i tryckbehållare kan effekten hos detta läkemedel minska när behållaren är kall. För bästa resultat bör läkemedlet förvaras i rumstemperatur före användning.
- Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Skyddas mot frost och direkt solljus.
- När du använt din inhalator, sätt alltid tillbaka locket på munstycket ordentligt och knäpp det på plats.
- Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Varning! Behållaren innehåller en vätska under tryck. Får ej utsättas för temperaturer över 50 °C. Stick inte hål på behållaren. Behållaren får inte brytas isär, punkteras eller brännas. Detta gäller även när den verkar tom.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är budesonid och formoterolfumaratdihydrat. Varje puff (inhalation) innehåller 80 mikrogram budesonid och 2,25 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Övriga innehållsämnen är: apafuran (HFA 227), povidon och makrogol. Inhalatorn är freonfri.

Detta läkemedel innehåller fluorerade växthusgaser. Varje inhalator innehåller 10,8 g apafuran (HFC-227ea), motsvarande 0,035 ton CO₂ (global warming potential GWP = 3 220).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Symbicort är en inhalator som innehåller ditt läkemedel. Tryckbehållaren har en fastsatt dosindikator och innehåller en vit suspension för inhalation. Behållaren sitter monterad i en röd inhalator av plast, med ett vitt munstycke i plast och en integrerad grå skyddskåpa i plast. Varje inhalator innehåller 60 eller 120 puffar efter att den har förberetts för användning. Varje inhalator är individuellt förpackad i ett folieomslag som innehåller ett torkmedel.

Symbicort, 80 mikrogram/2,25 mikrogram/puff inhalationsspray, suspension (budesonid/formoterolfumaratdihydrat) finns i förpackningar med en inhalator.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sverige

Tillverkare

AstraZeneca Dunkerque Production, 224 avenue de la Dordogne, 59640 Dunkerque, Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike: Symbicort 80 Mikrogramm/2,25 Mikrogramm/Inhalation Druckgasinhalation, Suspension;

Belgien: Symbicort 80 microgram/2,25 microgram/inhalatie, aérosol, suspensie; Symbicort 80 microgrammes/2,25 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé; Symbicort 80 Mikrogramm/2,25 Mikrogramm/Inhalation, Druckgasinhalation, Suspension;

Bulgarien: Симбикорт 80 микрограма/2,25 микрограма/впръскване Суспензия под налягане за инхалация; **Kroatien:** Symbicort 80 mikrograma/2,25 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija; **Cypern:** Symbicort 80 μικρογραμμάρια/2,25 μικρογραμμάρια/ψεκασμό; **Tjeckien:**

Symbicort 80 micrograms/2,25 micrograms/inhalation, suspension in pMDI; **Danmark:** Symbicort 80 mikrogram/2.25 mikrogram/inhalation; **Estland:** Symbicort; **Finland:** Symbicort 80 mikrog/2.25 mikrog/inhalaatio; **Frankrike:** Symbicort 100/3 microgrammes par inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé; **Grekland:** Symbicort

80 μικρογραμμάρια/2,25 μικρογραμμάρια/ψεκασμό; **Ungern:** Symbicort 2,25 mikrogramm/80 mikrogramm/ adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió; **Island:** Symbicort 80 míkrogrömm/2,25 míkrogrömm/ inhalation; **Italien:** Symbicort; **Lettland:** Symbicort 80 mikrogrami/2.25 mikrogrami/ inhalācijā, izsmidzinājuma, aerosols inhalācijām zem spiediena;

Litauen: Symbicort 80 mikrogramų/2,25 mikrogramo/išpurškime suslėgtoji įkvepiamoji suspensija; **Luxemburg:** Symbicort 80 microgrammes/2,25 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé; **Malta:** Symbicort 100 micrograms/3 micrograms/inhalation, pressurised inhalation, suspension; **Nederländerna:** Symbicort aérosol 100/3, 100 microgram/3 microgram per dosis, aérosol, suspensie; **Norge:** Symbicort 80 mikrogram/2.25 mikrogram/ inhalasjon; **Polen:**

Symbicort; **Portugal:** Symbicort 80 microgramas/2,25 microgramas/inalação Suspensão pressurizada para inalação; **Rumänien:** Symbicort 80 micrograme/2,25 micrograme/inhalație, suspensie de inhalat presurizată; **Slovakien:** Symbicort 80 mikrogramov/2,25 mikrogramov/inhalačná dávka, inhalačná suspenzia v tlakovom obale; **Slovenien:** Symbicort 80 mikrogramov/2,25 mikrograma na vdih, inhalacijska suspenzija pod tlakom; **Spanien:** Symbicort

80 microgramos/2,25 microgramos/inhalación suspensión para inhalación en envase a presión; **Sverige:** Symbicort 80 mikrogram/2,25 mikrogram/inhalation; **Storbritannien:** Symbicort 100 micrograms/3 micrograms actuation pressurised inhalation, suspension

Denna bipacksedel ändrades senast

2025-01-01