

Bipacksedel: Information till användaren

Torasemid Orifarm 10 mg tabletter

torasemid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Torasemid Orifarm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Torasemid Orifarm
3. Hur du tar Torasemid Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Torasemid Orifarm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Torasemid Orifarm är och vad det används för

Torasemid Orifarm 10 mg tabletter används vid behandling av:

- **svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppen (ödem)**

Torasemid Orifarm är ett diuretikum, vilket är ett läkemedel som ökar urinutsöndringen.

Torasemid som finns i Torasemid Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Torasemid Orifarm

Ta inte Torasemid Orifarm om du

- **är allergisk mot:**
 - **torasemid** eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 - liknande läkemedel som kallas sulfonureider, som används för att behandla högt blodsocker och som innehåller aktiva substanser med namn som för det mesta slutar på “-mid”
- **har njursvikt** med otillräcklig urinproduktion
- **har svåra leverskador** med förlorat medvetande
- **har lågt blodtryck**
- **har minskad blodvolym**
- **ammor**
- **har minskad kalium- eller natriumhalt i blodet**
- **har svåra urineringsbesvär** t.ex. orsakat av förstorad prostatakörtel
- **har gikt**
- **har oregelbunden hjärtrytm**
- **tar läkemedel för att behandla infektioner**, såsom cefixim, cefuroxim, cefaklor, cefalexin, cefadroxil, cefpodoximproxetil, kanamycin, neomycin, gentamicin, amikacin eller tobramycin
- **har nedsatt njurfunktion** på grund av läkemedel som orsakar njurskada.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Torasemid Orifarm om något av följande gäller dig:

- onormala förändringar i syra-basbalansen i kroppen
- avvikande förändringar i blodbilden
- du använder litium, ett läkemedel mot depression
- diabetes.

Om du fortlöpande använder torasemid kommer din läkare regelbundet kontrollera dina blodvärden, speciellt om du använder andra läkemedel, har diabetes eller lider av hjärtrytmrubbningar.

Barn och ungdomar

Torasemid Orifarm rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Torasemid Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Torasemid Orifarm:

- **läkemedel för behandling av högt blodtryck**, speciellt läkemedel vars aktiva substans slutar på "-pril"
- läkemedel som hjälper hjärtats pumpkraft, såsom **digitoxin, digoxin** eller **metyldigoxin**
- **läkemedel mot diabetes**
- **probenecid**, ett läkemedel mot gikt
- **läkemedel mot inflammation och smärta**, såsom acetylsalicylsyra eller indometacin
- **sulfasalazin, mesalazin eller olsalazin**, läkemedel som används mot kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar
- **läkemedel vid infektioner**, såsom cefixim, cefuroxim, cefaklor, cefalexin, cefadroxil, cefpodoximproxetil, kanamycin, neomycin, gentamicin, amikacin eller tobramycin
- **platinaföreningar**, såsom cisplatin (ett läkemedel mot cancer)
- **litium**, ett läkemedel vid depression
- **teofyllin**, ett läkemedel mot astma
- vissa **muskelavslappnande läkemedel** vars aktiva substans slutar på "-curonium" eller "-curium"
- **alla läkemedel mot förstoppning**
- **läkemedel som innehåller kortison**, såsom hydrokortison, prednison eller prednisolon
- **kolestyramin**, ett läkemedel som minskar nivåerna av blodfett
- **adrenalin** eller **noradrenalin**, läkemedel som ökar blodtrycket
- **warfarin**, ett läkemedel mot blodproppar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

- **Graviditet**
Ta Torasemid Orifarm under graviditet endast **om läkaren indikerar att det är absolut nödvändigt. Minsta möjliga dos** ska användas i dessa fall.
- **Amning**
Torasemid Orifarm får inte användas av kvinnor som ammar eftersom fostret kan skadas.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och dåsighet kan förekomma under behandling med Torasemid Orifarm, särskilt i början av behandlingen, vid ökning av dosen, vid ändring av läkemedel, insättning av ett tilläggsläkemedel eller

vid samtidigt intag av alkohol. **Undvik att köra bil eller använda maskiner om din uppmärksamhet är nedsatt.**

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Torasemid Orifarm innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos, en sockerart. Om du **inte tål vissa sockerarter**, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Torasemid Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Torasemid Orifarm 10 mg tabletter


Behandling av svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppen (ödem)

- **½ tablett en gång dagligen**

Vid behov kan din läkare stegvis öka dosen till 2 tabletter en gång dagligen.

Delning av tabletten:

Tabletten kan delas i två lika stora doser.



Placera tabletten på en hård, slät yta med brytningsskåran vänd uppåt. Pressa med ett finger vardera på höger sida om och vänster sida om delningsskåran och tabletten delas i två lika stora halvor.

Användning för barn och ungdomar

Det finns inte tillräckligt med erfarenhet av behandling med torasemid hos barn och ungdomar. Därför ska detta läkemedel inte användas till barn under 18 år.

Nedsatt leverfunktion som inte är allvarlig

Din läkare kommer att behandla dig försiktigt eftersom torasemidnivån i blodet kan öka.

Administreringssätt

Ta tabletterna **varje morgon** oberoende av måltid, får ej tuggas, med 100 ml vatten, motsvarande ett halvt dricksglas.

Behandlingens längd

Detta bestäms av din läkare. Torasemid Orifarm kan användas kontinuerligt under några år eller till dess överflödigt vävnadsvätska har försvunnit.

Om du har tagit för stor mängd av Torasemid Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdoserering kan troligtvis leda till ökad vattenkastning (urinering), sömnhet, förvirring, svaghet, yrsel, hypotension, cirkulationskollaps, orolig mage.

Tag alltid med dig eventuella överblivna tabletter och även förpackningen, eftersom detta underlättar identifikationen av tabletterna.

Om du har glömt att ta Torasemid Orifarm

Ta den glömda dosen så snart som möjligt samma dag eller ta nästa dos som normalt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Torasemid Orifarm

Sluta inte ta Torasemid Orifarm utan din läkares tillstånd, eftersom detta kan skada dig allvarligt och minska den terapeutiska effekten.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar kan förekomma i följande frekvenser:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

- störningar i mängden vatten och mineraler i kroppen, i synnerhet när det finns en tydlig begränsning av saltintaget
- alkaliöverskott i kroppen
- muskelkramper
- ökade koncentrationer av urinsyra, socker och fetter i blodet
- minskade nivåer av kalium och natrium i blodet
- minskad blodvolym
- mag- och/eller tarmbesvär, som t.ex. aptitlöshet, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning
- ökning av vissa leverenzym, som t.ex. gamma-GT
- huvudvärk
- yrsel
- trötthet
- svaghet.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

- ökning i koncentrationen av substanserna urea och kreatinin i blodet
- muntorrhet
- myrkrypningar och stickningar i armar och ben
- svårigheter vid vattenkastning (urinering) (t.ex. på grund av prostataförstoring)

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

- förträngningar eller sammandragningar i blodkärl orsakade av blodförtjockning
- onormalt lågt blodtryck
- cirkulationsproblem, i synnerhet vid uppresning
- oregelbunden hjärtrytm
- angina pectoris, ett tillstånd som ofta kännetecknas av kraftig smärta i bröstet
- hjärtinfarkt

- svimning
- bukspottkörtelinflammation
- allergiska reaktioner med klåda och utslag
- ökad ljuskänslighet i huden
- allvarliga hudreaktioner
- minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar
- synnedsättning
- öronsusningar
- minskad hörselförmåga.

Har rapporterats: förekommer hos okänt antal användare:

- otillräckligt blodflöde till hjärnan
- förvirring.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Torasemid Orifarm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Torasemid Orifarm innehåller

- Den aktiva substansen är torasemid.
Varje tablett innehåller 10 mg torasemid.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende

Torasemid Orifarm 10 mg tabletter:

Torasemid Orifarm är runda, vita till benvita tabletter med kryssformad brytskåra.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB
 Box 56048, 102 17 Stockholm
 Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Novartis-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-17