

Bipacksedel: Information till användaren

Torasemid Zentiva 2,5 mg tabletter

Torasemid Zentiva 5 mg tabletter

Torasemid Zentiva 10 mg tabletter

Torasemid Zentiva 20 mg tabletter

torasemid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Torasemid Zentiva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Torasemid Zentiva
3. Hur du tar Torasemid Zentiva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Torasemid Zentiva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Torasemid Zentiva är och vad det används för

Torasemid Zentiva används vid behandling av svullnad orsakad av vätskeansamling i kroppen (ödem).

Dessutom används Torasemid Zentiva 2,5 mg och 5 mg tabletter för behandling av högt blodtryck.

Torasemid Zentiva är ett urindrivande medel, ett diuretikum, men har med den dosering som är aktuell för blodtrycksbehandling svag diuretisk effekt. Den diuretiska effekten inträder inom 1 timme med maximal effekt efter 2–3 timmar och kvarstår upp till 12 timmar. Maximal blodtryckssänkande effekt vid upprepad dosering ses efter upp till 10–12 veckor.

Torasemid Zentiva är indicerat för vuxna och ungdomar över 12 år.

Torasemid som finns i Torasemid Zentiva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Torasemid Zentiva

Ta inte Torasemid Zentiva om du:

- är allergisk mot torasemid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),
- är allergisk mot sulfonyleurea (läkemedel som används för att behandla diabetes),
- har svår leversjukdom,
- har minskad blodvolym,
- inte har någon urinproduktion,
- har lågt blodtryck.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Torasemid Zentiva:

- Om du har låga halter av kalium och natrium i blodet,
- Om du har urineringsbesvär,
- Om du har vätskebrist och är uttorkad,
- Om du har nedsatt njurfunktion,
- Om du har oregelbunden hjärtrytm,
- Om du har diabetes,
- Om du har skrumplever eller vätska i buken.

Barn och ungdomar

Torasemid Zentiva ska inte användas av barn under 12 år.

Andra läkemedel och Torasemid Zentiva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Torasemid Zentiva kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:

- probenecid (läkemedel vid gikt)
- acetylsalicylsyra (smärtstillande)
- blodförtunnande läkemedel av kumarintyp (t.ex. warfarin)
- vissa läkemedel vid hjärtsjukdomar som t.ex. digitalisglykosider och ACE-hämmare
- läkemedel mot diabetes
- kolestyramin (kolesterol- och triglyceridsänkande läkemedel)
- vissa läkemedel vid infektioner som t.ex. gentamicin, tobramycin och cefalosporiner
- vissa icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID)
- cisplatin (cytostatika – för att behandla cancer)
- litium (antipsykotiskt läkemedel)
- laxermedel
- glukokortikoider och mineralokortikoider
- teofyllin (mot t.ex. astma)
- muskelavslappnande läkemedel

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför med läkare före användning av Torasemid Zentiva under graviditet.

Okänt om Torasemid Zentiva passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Torasemid Zentiva kan försämra reaktionsförmågan. Detta gäller framför allt i början av behandlingen eller när behandlingen ändras.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Torasemid Zentiva innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du tar Torasemid Zentiva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Högt blodtryck

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid högt blodtryck är 2,5 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till högst 5 mg 1 gång dagligen.

Vätskeansamling i kroppen (ödem)

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid ödem orsakad av hjärt- eller leversvikt är 5–10 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till antingen 20 mg per dag eller, i sällsynta fall 40 mg per dag.

Vanlig dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid ödem orsakad av lägre njurfunktion är 20 mg dagligen förslagsvis till frukost. Vid behov kan läkaren öka dosen till 50 mg per dag och sedan, om nödvändigt, gradvis öka upp till 200 mg en gång dagligen.

Hur man tar tabletterna

Tabletterna ska sväljas med lite vätska och ska inte tuggas. Tabletterna kan med fördel tas på morgonen. De kan tas med eller utan föda.

Om du har tagit för stor mängd av Torasemid Zentiva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Torasemid Zentiva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Torasemid Zentiva och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

- Extremt kraftiga och allvarliga hudbiverkningar såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare) vid användning av Torasemid Zentiva.
Hudbiverkningarna kan bestå av utslag med eller utan blåsor. Även hudrodnad, sår eller svullnad i mun, hals, ögon, näsa och runt könsorganen samt feber och influensaliknande symtom kan förekomma. Hudutslagen kan utvecklas till allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) med livshotande följder.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- huvudvärk
- yrsel
- trötthet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- minskade nivåer av kalium i blodet
- leverpåverkan;

- urinblåsebesvär;
- förhöjda halter av blodsocker, blod triglycerider och kolesterol;
- överproduktion urinsyra;
- aptitförlust;
- kraftlöshet;
- mag- eller muskelbesvär;
- kräkning, diarré, förstoppning, illamående;
- muskelkramp.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- Hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, kärlkramp;
- ändrade halter av kreatinin, urea och natrium i blodet;
- blodvärdesförändringar;
- överkänslighet mot solljus;
- klåda, nässelutslag (urtikaria);
- hörselnedsättning, tinnitus (ringningar i öronen);
- myrkrypningar och stickningar i armar och ben;
- muntorrhet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- Hjärninfarkt (stroke), blodpropp;
- pankreatit (bukspottkörtelinflammation);
- synrubbingar;
- svimning;
- förvirringstillstånd.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Torasemid Zentiva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är torasemid.
Torasemid Zentiva 2.5 mg tabletter: Varje tablett innehåller 2,5 mg torasemid.

Torasemid Zentiva 5 mg tabletter: Varje tablett innehåller 5 mg torasemid.
Torasemid Zentiva 10 mg tabletter: Varje tablett innehåller 10 mg torasemid.
Torasemid Zentiva 20 mg tabletter: Varje tablett innehåller 20 mg torasemid.

- Övrigt innehållsämnen är laktosmonohydrat, hypromellos (E464), natriumstärkelseglykolat (typ A), kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstearylfumarat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Torasemid Zentiva 2,5 mg tabletter: Vit till benvit rund tablett med en diameter på cirka 5 mm.

Torasemid Zentiva 5 mg tabletter: Vit till benvit avlång tablett med en diameter på cirka 9 x 4 mm med skåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Torasemid Zentiva 10 mg tabletter: Vit till benvit rund tablett med en diameter på cirka 9 mm med ettpräglat "e" mitt på ena sidan.

Torasemid Zentiva 20 mg tabletter: Vit till benvit avlång tablett med en diameter på cirka 14 × 7 mm.

PVC/Alufolie blister.

Förpackningsstorlekar

Torasemid Zentiva 10 mg tabletter: 14, 30 tabletter

Torasemid Zentiva 2,5 mg, 5 mg, 20 mg tabletter: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 112, 120, 150, 168, 180 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Zentiva k.s.
U kabelovny 130
Dolní Měcholupy,
102 37 Prag 10
Tjeckien

Lokal företrädare

Zentiva Denmark ApS
Fuglevangsvej 11
DK-1962 Frederiksberg
Danmark
Info.nordics@zentiva.com

Denna bipacksedel ändrades senast

2025-06-27