

Bipacksedel: Information till användaren

Varenicline Teva 0,5 mg filmdragerade tabletter

Varenicline Teva 1 mg filmdragerade tabletter

vareniklin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Varenicline Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Varenicline Teva
3. Hur du tar Varenicline Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Varenicline Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Varenicline Teva är och vad det används för

Varenicline Teva innehåller den aktiva substansen vareniklin. Varenicline Teva är ett läkemedel som används för vuxna vid rökavvänjning.

Varenicline Teva kan hjälpa till att lindra begäret och andra symtom som kan förekomma när man vill försöka sluta röka.

Varenicline Teva kan även minska nöjet med cigaretterna om du röker under behandlingen.

Vareniklin som finns i Varenicline Teva kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Varenicline Teva

Ta inte Varenicline Teva

- om du är allergisk mot vareniklin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Varenicline Teva.

Det har förekommit fall av depression, självmordstankar, självmordsbeteende och självmordsförsök hos patienter som tar Varenicline Teva. Om du tar Varenicline Teva och utvecklar oro, nedstämdhet, förändringar i ditt beteende som oroar dig eller dina anhöriga eller om du upplever självmordstankar eller självmordsbeteende ska du sluta ta Varenicline Teva och kontakta din läkare omedelbart för en bedömning av behandlingen.

Effekterna av rökavvänjning

Förändringarna som sker i din kropp när du slutar röka, oavsett om du behandlas med Varenicline

Teva eller inte, kan påverka effekten hos andra läkemedel. I vissa fall kan därför dosen behöva justeras. För mer information se nedan under ”Andra läkemedel och Varenicline Teva”.

Vissa människor som försökt sluta röka, med eller utan behandling, har upplevt en ökad grad av psykiska symtom som förändrat tankesätt eller beteende, depression eller oro och kan leda till försämring av psykisk sjukdom. Om du tidigare haft en psykisk sjukdom ska du diskutera detta med din läkare.

Hjärtsymtom

Nya eller förvärrade symtom från hjärta eller blodkärl (kardiovaskulära) har rapporterats främst hos patienter som redan har hjärt-kärlsjukdom. Berätta för din läkare om dina symtom förändras under behandling med Varenicline Teva. Sök akut medicinsk hjälp omedelbart om du får symtom på hjärtinfarkt eller stroke.

Kramper

Tala om för läkare om du har haft kramper eller lider av epilepsi innan du börjar din behandling med Varenicline Teva. En del patienter har rapporterat om kramper under behandling med Varenicline Teva.

Överkänslighetsreaktioner

Sluta ta Varenicline Teva och kontakta omedelbart läkare om du får några av följande tecken och symtom som kan tyda på en allvarlig allergisk reaktion: svullnad av ansikte, läppar, tunga, gom, hals eller kropp och/eller andningssvårigheter, väsande andning.

Hudreaktioner

Potentiellt livshotande hudutslag (Stevens-Johnsons syndrom och erythema multiforme) har rapporterats vid användning av Varenicline Teva. Om du får utslag eller om huden börjar fjälla eller om du får blåsor ska du sluta ta Varenicline Teva och omedelbart söka akut medicinsk hjälp.

Barn och ungdomar

Varenicline Teva rekommenderas inte för behandling av barn eller ungdomar under 18 år eftersom effekt inte har visats.

Andra läkemedel och Varenicline Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Som ett resultat av att sluta röka med eller utan Varenicline Teva, kan i vissa fall dosen av andra läkemedel behöva justeras. Exempel är teofyllin (ett läkemedel som används vid andningssvårigheter), warfarin (ett läkemedel för att minska risken för blodpropp) och insulin (ett läkemedel mot diabetes). Om du är osäker bör du rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Om du har svår njursjukdom bör du undvika att ta cimetidin (ett läkemedel som används för magproblem) samtidigt som Varenicline Teva eftersom detta kan orsaka förhöjda blodnivåer av Varenicline Teva.

Användning av Varenicline Teva tillsammans med andra behandlingar för rökavvänjning

Prata med läkare innan du använder Varenicline Teva i kombination med andra rökavvänjningsbehandlingar.

Varenicline Teva med mat och dryck

Det har inkommit några rapporter om ökad förgiftningseffekt av alkohol hos patienter som tar Varenicline Teva. Det är dock inte känt huruvida Varenicline Teva verkligen ökar förgiftningseffekten av alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte ta Varenicline Teva om du är gravid. Tala med läkare om du planerar att skaffa barn.

Även om det inte har studerats, kan Varenicline Teva passera över i bröstmjolk. Du ska rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Varenicline Teva.

Körförmåga och användning av maskiner

Varenicline Teva kan vara förknippat med yrsel, sömnhet och övergående medvetandeförlust. Du ska inte köra bil, använda avancerade maskiner eller delta i andra eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet om detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. Hur du tar Varenicline Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Det går lättare för dig att sluta röka om du är motiverad. Läkare och apotekspersonal kan ge dig råd och stöd samt informationsbroschyrer, som kan hjälpa dig att lyckas sluta röka.

Innan du börjar behandlingen med Varenicline Teva ska du vanligtvis bestämma en dag under den andra behandlingsveckan (mellan Dag 8 och Dag 14) när du vill sluta röka. Om du inte vill eller kan sätta ett målslutdatum inom 2 veckor kan du välja ditt eget målslutdatum inom 5 veckor efter påbörjad behandling. Skriv ner detta datum på förpackningen som en påminnelse.

Varenicline Teva är en vit tablett (0,5 mg) och en ljusblå tablett (1 mg). Du börjar med den vita tabletten och övergår sedan vanligtvis till den ljusblå tabletten. Se tabellen nedan för de vanliga doseringsanvisningar som du ska följa från Dag 1.

Vecka 1	Dos
Dag 1-3	Från Dag 1 till Dag 3 ska du ta en vit Varenicline Teva 0,5 mg filmdragerad tablett en gång om dagen.
Dag 4-7	Från Dag 4 till Dag 7 ska du ta en vit Varenicline Teva 0,5 mg filmdragerad tablett två gånger om dagen, morgon och kväll, vid ungefär samma tid varje dag.

Vecka 2	
Dag 8-14	Från Dag 8 till Dag 14 ska du ta en ljusblå Varenicline Teva 1 mg filmdragerad tablett två gånger om dagen, morgon och kväll, vid ungefär samma tid varje dag.

Vecka 3-12	
Dag 15-slutet av behandlingen	Från Dag 15 och fram till slutet av behandlingen ska du ta en ljusblå Varenicline Teva 1 mg filmdragerad tablett två gånger om dagen, morgon och kväll, vid ungefär samma tid varje dag.

Om du lyckats sluta röka efter 12 veckors behandling, kan din läkare rekommendera en extra 12-veckorsbehandling med Varenicline Teva 1 mg filmdragerade tabletter två gånger om dagen för att hjälpa dig att inte börja röka igen.

Om du inte kan eller vill sluta röka direkt bör du minska på rökningen under behandlingens 12 första veckor och sluta röka helt när behandlingsperioden är slut. Du bör därefter fortsätta ta Varenicline

Teva 1 mg filmdragerade tabletter två gånger om dagen i ytterligare 12 veckor, vilket ger en behandlingslängd på totalt 24 veckor.

Skulle du uppleva biverkningar som du inte kan stå ut med kan din läkare besluta att sänka dosen till 0,5 mg två gånger om dagen tillfälligt eller permanent.

Om du har problem med njurarna, tala med läkare innan du tar Varenicline Teva. Du kan behöva en lägre dos.

Varenicline Teva är för oral användning.

Tabletterna ska sväljas hela med vatten och kan tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Varenicline Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig asken med tabletter till sjukhuset.

Om du har glömt att ta Varenicline Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Det är viktigt att du tar Varenicline Teva regelbundet vid samma tid varje dag. Om du glömmar att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Om nästa dos ska tas inom 3-4 timmar, hoppa då över den tablett du har missat.

Om du slutar att ta Varenicline Teva

I kliniska prövningar har det visat sig att dina chanser att lyckas sluta röka ökar om du tar alla doser av läkemedlet i rätt tid och under så lång tid som anges ovan. Det är därför viktigt att fortsätta att ta Varenicline Teva enligt instruktionerna i tabellen ovan, såvida inte din läkare ber dig att avsluta behandlingen.

Vid rökavvänjning är risken för att man åter börjar röka förhöjd under en period i direkt anslutning till att behandlingen avslutas. Du kan tillfälligt uppleva ökad irritation, röksug, depression och/eller sömnstörningar när du slutar ta Varenicline Teva. Din läkare kan besluta att gradvis sänka din dos av Varenicline Teva vid slutet av behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Att sluta röka med eller utan behandling kan ge upphov till olika symtom. Dessa kan inkludera humörsvängningar (som att känna sig deprimerad, irriterad, frustrerad eller orolig), sömnlöshet, koncentrationssvårigheter, minskad hjärtfrekvens och ökad aptit eller viktökning.

Du måste vara medveten om att allvarliga neuropsykiatriska symtom, som till exempel oro, nedstämdhet eller beteendeförändringar, kan utvecklas när man försöker sluta röka, oavsett om man behandlas med Varenicline Teva eller inte. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du får sådana symtom.

Allvarliga biverkningar som kategoriserats som mindre vanliga eller sällsynta har förekommit hos personer som har försökt att sluta röka med Varenicline Teva: krampanfall, stroke, hjärtattack, självmordstankar, förlorad kontakt med verkligheten och oförmåga att tänka klart (psykos), förändrat tankesätt eller beteende (såsom aggression och onormalt beteende). Det har också förekommit rapporter om svåra hudreaktioner, inklusive erythema multiforme (en typ av hudutslag) samt Stevens-Johnsons syndrom (en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, runt ögonen eller könsorganen) och allvarliga allergiska reaktioner inklusive angioödem (svullnad av ansikte, mun eller

hals).

- Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):
 - o Inflammation i näsa och hals, onormala drömmar, sömnsvårigheter, huvudvärk
 - o Illamående
- Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
 - o Luftvägsinfektion, bihåleinflammation
 - o Viktökning, minskad aptit, ökad aptit
 - o Sömnighet, yrsel, förändrat smaksinne
 - o Andnöd, hosta
 - o Halsbränna, kräkningar, förstoppning, diarré, uppkördhet, buksmärta, tandvärk, matsmältningsbesvär, gaser, muntorrhet
 - o Hudutslag, klåda
 - o Ledvärk, muskelvärk, ryggsmärta
 - o Bröstsmärta, trötthet
- Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
 - o Svampinfektion, virusinfektion
 - o Panikkänsla, svårigheter att tänka, rastlöshet, humörförändringar, depression, ångest, hallucinationer, förändrad sexlust
 - o Krampanfall, skakningar, tröghetskänsla, mindre känslig för beröring
 - o Bindhinneinflammation i ögat (konjunktivit), ögonsmärta
 - o Öronringningar
 - o Kärlekskramp, snabb hjärtrytm, hjärklappning, ökad hjärtfrekvens
 - o Ökat blodtryck, värmevallningar
 - o Inflammation i näsa, bihålor eller hals, tilltäppt näsa, hals och bröst, heshet, hörsnuva, halsirritation, tilltäppta bihålor, stor slembildning från näsan vilket orsakar hosta, rinnande näsa
 - o Rött blod i avföringen, magirritation, förändrade avföringsvanor, rapningar, sår i munnen, smärta i tandköttet
 - o Hudrodnad, akne, ökad svettning, nattliga svettningar
 - o Muskelspasmer, smärta i bröstväggen
 - o Behov att urinera onormalt ofta, nattlig urineringsfrekvens
 - o Ökad menstruation
 - o Obehagskänsla i bröstet, influensaliknande sjukdom, feber, svaghetskänsla eller allmän sjukdomskänsla
 - o Högt blodsocker
 - o Hjärtattack
 - o Självmordstankar
 - o Förändrat tankesätt eller beteende (såsom aggression)
- Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):
 - o Stark törst
 - o Sjukdomskänsla eller humörsvackor, långsamt tänkande
 - o Stroke
 - o Ökad muskelspänning, talsvårigheter, koordinationsproblem, försämrat smaksinne, förändrat sömnmönster
 - o Synstörningar, missfärgning av ögonen, förstörade pupiller, ljuskänslighet, närsynthet, vattniga ögon
 - o Oregelbunden hjärtrytm eller rubbad hjärtrytm
 - o Halssmärta, snarkning
 - o Blodiga kräkningar, onormal avföring, tungbeläggningar
 - o Ledstelhet, smärta i revbenen
 - o Socker i urinen, ökad urinvolymer och urineringsfrekvens
 - o Vaginala flytningar, förändrad sexuell förmåga
 - o Känsla av frusenhet, cystor

- o Diabetes
 - o Sömngång
 - o Förlorad kontakt med verkligheten och oförmåga att tänka klart (psykos)
 - o Onormalt beteende
 - o Svåra hudreaktioner, inklusive erythema multiforme (en typ av hudutslag) samt Stevens-Johnsons syndrom (en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, runt ögonen eller könsorganen)
 - o Allvarliga allergiska reaktioner inklusive angioödem (svullnad av ansikte, mun eller hals)
- Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):
- o Övergående medvetandeförlust

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Varenicline Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret eller burketiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är vareniklin.
- Varje 0,5 mg filmdragerad tablett innehåller 0,5 mg vareniklin (som citrat).
- Varje 1 mg filmdragerad tablett innehåller 1 mg vareniklin (som citrat).
- Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse (majsstärkelse), propylgallat, magnesiumstearat, vattenfri citronsyra
Filmdragering – Varenicline Teva 0,5 mg: hypromellos (E464), titandioxid (E171)
Filmdragering – Varenicline Teva 1 mg: hypromellos (E464), titandioxid (E171), indigokarmin (E132)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

- Varenicline Teva 0,5 mg är vita, kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med "0.5" på ena sidan.
- Varenicline Teva 1 mg är ljusblåa, kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med "1.0" på ena sidan.

Varenicline Teva finns i följande förpackningar:

PVC/PE/PVdC-aluminium blister:

Förpackning med 25 filmdragerade tabletter:

Varje förpackning innehåller 25 filmdragerade tabletter för två veckors behandlingsschema, 11 filmdragerade tabletter Varenicline Teva 0,5 mg och 14 filmdragerade tabletter Varenicline Teva 1 mg.

Förpackning med 53 filmdragerade tabletter:

Varje förpackning innehåller 53 filmdragerade tabletter för fyra veckors behandlingsschema, 11 filmdragerade tabletter Varenicline Teva 0,5 mg och 42 filmdragerade tabletter Varenicline Teva 1 mg.

Förpackning med 165 filmdragerade tabletter:

Varje förpackning innehåller 165 filmdragerade tabletter för tolv veckors behandlingsschema, 11 filmdragerade tabletter Varenicline Teva 0,5 mg och 154 filmdragerade tabletter Varenicline Teva 1 mg.

PVC/PE/PVdC-aluminium perforerade endosblister:

Förpackning med 165 filmdragerade tabletter:

Varje förpackning innehåller 165x1 filmdragerade tabletter för tolv veckors behandlingsschema, 11x1 filmdragerade tabletter Varenicline Teva 0,5 mg och 154x1 filmdragerade tabletter Varenicline Teva 1 mg.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederländerna

Tillverkare

Delorbis Pharmaceuticals Ltd.
17 Athinon Str.
Ergates Industrial Area
2643 Ergates, Lefkosia
Cypern

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park,
Paola, PLA 3000,
Malta

Denna bipacksedel ändrades senast

2025-02-26