

## **Bipacksedel: Information till användaren**

### **Vermox® 100 mg tabletter** mebendazol

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.** Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om besvären kvarstår efter upprepade behandling.

#### **I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Vermox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox
3. Hur du använder Vermox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vermox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### **1. Vad Vermox är och vad det används för**

Vermox används för behandling av springmask hos vuxna och barn från 2 år.

Vermox förhindrar maskens ämnesomsättning vilket leder till att masken dör. Vermox hämmar också utvecklingen av maskägg.

För att undvika smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt.

Mebendazol som finns i Vermox kan också vara godkänd för att behandla andra tillstånd som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

#### **2. Vad du behöver veta innan du använder Vermox**

##### **Använd inte Vermox**

- om du är allergisk mot mebendazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

##### **Varningar och försiktighet**

Vermox ska inte användas till barn under 1 år. Kramper har rapporterats hos barn, inklusive hos spädbarn (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar). Vermox ska endast ges till barn under 2 år om läkaren specifikt har ordinerat det.

##### **Andra läkemedel och Vermox**

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vermox kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämne/ämnen:

- metronidazol. Läkemedel som innehåller metronidazol ska inte användas samtidigt som Vermox. Metronidazol är ett antibiotikum, läkemedel mot infektioner av bakterier och protozoer. Det finns misstanke om samband med allvarliga hudreaktioner vid samtidig användning av Vermox och metronidazol. Se även avsnitt 4 Eventuella biverkningar
- cimetidin (mot magsår). Tala med din läkare om du använder läkemedel som innehåller cimetidin.

## **Graviditet och amning**

### Graviditet

Gravida ska endast använda Vermox efter ordination av läkare.

Erfarenheten av användning av Vermox under graviditet är begränsad.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådgör alltid med läkare innan du använder detta läkemedel.

### Amning

Vermox kan gå över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

## **Körförmåga och användning av maskiner**

I sällsynta fall har yrsel och krampanfall rapporterats hos vissa patienter som använder Vermox.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

## **Vermox tabletter innehåller para-orange (E110) och natrium**

Vermox tabletter innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan ge allergiska reaktioner.

Vermox tabletter innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## **3. Hur du använder Vermox**

Använd alltid detta läkemedel enligt denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Överväg att använda Vermox oral suspension om du eller ditt barn inte kan svälja tablett.

### Rekommenderad dos för vuxna och barn från 2 år:

Vid springmask: 1 tablett som engångsdos.

Upprepa behandlingen efter cirka 2 veckor. Det förebygger återfall och är nödvändigt för att helt bli av med maskarna. Den första behandlingen dödar maskarna, men inte deras ägg. När äggen kläcks kan en ny infektion uppstå om du inte upprepar behandlingen. Kontakta läkare om symtomen inte försvinner inom några dagar efter upprepad behandling.

Överskrid inte doseringen.

Om Vermox har förskrivits av läkare för annan användning än springmask så kan annan dosering gälla, kontakta läkare för lämplig dos att använda.

För att undvika smittspridning rekommenderas att alla i familjen behandlas samtidigt.

Noggrann hygien, såväl personlig som i omgivningen är väsentlig för att minska risken för återsmitta. Du bör därför följa hygienråden nedan:

1. Tvätta stjärten och angränsande hudområden dagligen med tvål och vatten.
2. Tvätta händerna ofta. Håll naglarna korta och rena.

3. Sov i pyjamas eller åtsittande byxor. Byt underkläder och pyjamas dagligen.
4. Byt och tvätta sängkläderna ofta.
5. Använda kläder bör tvättas samma dag de bytes.
6. Badkar, handfat, badrumsgolv och toalettstol avtvättas dagligen.
7. Husdjur drabbas ej av springmask, men maskägglar kan finnas i pälsen. Tvätta därför hundar och katter.

Vermox ska inte användas till barn under 1 år. Vermox ska endast ges till barn under 2 år om läkaren specifikt har ordinerat det.

#### **Om du använt för stor mängd av Vermox**

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

#### **Om du har glömt att använda Vermox**

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

### **4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

**Sluta att ta Vermox och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du får:**

Något av följande sällsynta symtom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter.

Mycket kraftiga och allvarliga sällsynta hudbiverkningar såsom Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats vid användning av Vermox. Hudbiverkningarna kan bestå av utslag med eller utan blåsor. Även hudrodnad, sår eller svullnad i mun, hals, ögon, näsa och runt könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom) samt feber och influensaliknande symptom kan förekomma. Hudutslagen kan utvecklas till allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) med livshotande följder.

#### **Övriga biverkningar**

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- buksmärta.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- obehag från buken, diarré, gasbildning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- minskat antal vita blodkroppar
- överkänslighetsreaktioner (inklusive anafylaktiska reaktioner med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall)
- krampanfall, yrsel
- inflammation i levern (hepatit), leverpåverkan
- hudutslag, hudrodnad, nässelfeber, håravfall.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- illamående, kräkningar

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

### **Rapportering av biverkningar**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

Webbplats: [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)

## **5. Hur Vermox ska förvaras**

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”EXP.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## **6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**

### **Innehållsdeklaration**

Vermox 100 mg tabletter:

- Den aktiva substansen är mebendazol.
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, majsstärkelse, sackarinnatrium, hydrerad bomullsfröolja, magnesiumstearat, smakämne (apelsinensens), vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurylsulfat, para-orange (E110).

### **Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**

Vermox tabletter är svagt orangea, runda med en diameter på 10 mm och märkta Me/100 respektive JANSSEN. Skåran är inte avsedd för delning av tabletten. Tabletterna tillhandahålls i en tryckförpackning med 6 tabletter.

### **Parallellimportör**

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

### **Ompackare**

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav., Litauen

### **Tillverkare**

Lusomedicamenta Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Barcarena, Portugal

**Denna bipacksedel ändrades senast 2025-06-03**