

## Användarinformation

### Vetrimoxin vet 20 mg/g oral pasta

*Observera att veterinär kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller annan dosering än angiven i denna information. Följ alltid veterinärens ordination och anvisningarna på apoteketiketten.*

### VAD INNEHÅLLER VETRIMOXIN VET?

Oral pasta

Ett gram innehåller: Verksamt ämne Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 20 mg

### HUR VERKAR LÄKEMEDLET?

Vetrimoxin vet är ett antibiotikum som är verksamt mot bakteriella infektioner.

### INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Ceva Santé Animale, BP 126, 33501 Libourne Cedex, Frankrike

### INFORMATION LÄMNAS AV

CEVA Animal Health AB, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund. Tel 046-12 81 00.

### TILLVERKARE

Vetem S.p.A., Porto Empedocle, Italien.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bakteriella infektioner hos hund och katt.

Exempel: Urinvägsinfektioner, infektioner i övre och nedre luftvägarna, mag-tarmkanal, sårinfektioner och bölder.

### NÄR SKA LÄKEMEDLET INTE ANVÄNDAS

Vid överkänslighet mot penicillin.

### DRÄKTIGHET OCH DIGIVNING

Vetrimoxin vet. kan ges till dräktiga och digivande hundar och katter.

### DOSERING

**Hund och katt:** Normaldosen är 10 mg amoxicillin per kg kroppsvikt två gånger dagligen. 1 g oral pasta (20 mg amoxicillin) per 2 kg kroppsvikt två gånger dagligen. 1 g oral pasta motsvarar 1 ml på doseringssprutans stång.

Normal behandlingstid är 7-10 dagar. Vid kroniska infektioner i t ex urinvägar kan behandlingstiden behöva förlängas något.


### BRUKSANVISNING

Pastan kan inblandas i maten eller ges direkt i munnen. Till katt kan pastan även ges påstruken på en tass, varefter katten slickar i sig pastan. Vetrimoxin vet. har leversmak och accepteras i regel väl.

Sprutan har en graderad doseringsstång (1). Stångens gradering avser ml oral pasta. 1 g oral pasta motsvarar 1 ml på doseringssprutans stång. På stången finns en inställningsring (2) som kan ställas vid önskad gradering. Vid behov kan ringen även ställas mellan hela ml. När

pastan skall ges placeras inställningsringen på ordinerat antal ml innan skyddskorken (3) avlägsnas. Rätt mängd pasta kommer då att erhållas.

Exempel: En katt som ordinerats 2 ml (=2 g) Vetrिमoxin vet oral pasta per behandlingstillfälle. Vid första behandlingstillfället ställs ringen vid 2 ml, vid andra tillfället vid 4 ml osv.



### **BIVERKNINGAR**

Mag- och tarmstörningar kan förekomma.

### **FÖRVARING OCH HÅLLBARHET**

Förvaras vid högst 25°C.

Användes före utgångsdatum, se förpackning.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Senaste revidering av bipacksedeln: 2024-01-22