

Bipacksedel: Information till patienten

Virono 50 mg häftande buckaltabletter

aciclovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Om symtomen försämras eller inte förbättras 5 dagar efter behandling kontakta läkare för rådgivning.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Virono är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Virono
3. Hur du använder Virono
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Virono ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Virono är och vad det används för

Virono innehåller den aktiva substansen aciklovir och ingår i en läkemedelsgrupp som kallas antivirala läkemedel.

Virono används för behandling av återkommande munsår på läpparna (återkommande herpes labialis) som orsakas av herpes simplex-virus hos vuxna vars immunsystem fungerar normalt. Virono ska placeras direkt på tandköttet (inte på det faktiska området med munsår) så snart de första symtomen (sveda, stickningar, klåda) eller tecknen (rodnad, svullnad) uppkommer.

Viruset orsakar blåsor eller sår, mest på läpparna men ibland också i andra delar av ansiktet. Virusinfektionen kan aktiveras då immunförsvaret är försvagat, t.ex. av förkylningar eller andra infektioner. Stark sol, stress eller menstruation kan också sätta igång symtomen.

Virono hämmar virusets förmåga att föröka sig, och får därigenom infektionen att gå tillbaka.

Om symtomen försämras eller inte förbättras 5 dagar efter behandling kontakta läkare för rådgivning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Virono

Använd inte Virono

- Om du är allergisk mot aciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- Om du är allergisk mot mjölk eller mjölkprotein.

Varningar och försiktighet

- Virono kan sväljas av misstag. Om du sväljer Virono av misstag rekommenderas du dricka ett glas vatten.
- Tala med läkare innan du använder detta läkemedel om du har ett nedsatt immunförsvar (till följd av annan sjukdom som påverkar immunsystemet, t.ex. AIDS) eller p.g.a. en behandling som påverkar ditt immunsystem (t.ex. immunsuppressiva läkemedel). Virono ska inte användas i det fallet.
- Det är inte känt om Virono kommer att fungera om produkten används efter att blåsor redan uppkommit. Därför ska Virono bara användas så snart du känner av de första symtomen på munsår (klåda, rodnad eller stickningar).
- Du måste även kontakta läkare vid frekvent återkommande tillfällen med munsår (fler än 4 per år), eller om förekomsten av antal tillfällen med munsår nyligen har ökat eller om de har utvidgats till andra delar av kroppen.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Virono

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Virono med mat, dryck och alkohol

Du kan äta och dricka normalt efter att ha placerat Virono på tandköttet.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Virono förväntas inte ha någon effekt på det ofödda barnet.

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas användning av Virono under graviditet endast om det är nödvändigt.

Amning

Användning av Virono under amning förväntas inte påverka det ammande spädbarnet. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas användning under amning endast om det är nödvändigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Virono innehåller mjölkprotein koncentrat med spår av laktos och natriumlaurilsulfat

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mjölkprotein som kan framkalla allergiska reaktioner hos personer med svår överkänslighet eller allergi mot mjölkprotein.

Detta läkemedel innehåller 5,2 mg natriumlaurilsulfat per tablett.

Natriumlaurilsulfat kan ge lokala hudreaktioner (stickande eller brännande) eller öka hudreaktioner orsakade av andra produkter som används på samma hudyta. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Virono

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är en tablett Virono som engångsdos. Används en gång per tillfälle med munsår. Appliceras på tandköttet så snart de första symtomen eller tecknen på munsår uppträder.

Om symtomen försämras eller inte förbättras 5 dagar efter behandling kontakta läkare för rådgivning.

SVÄLJ INTE Virono


Om du sväljer Virono av misstag, drick ett glas vatten.

Bruksanvisning för korrekt användning

Om munnen är torr rekommenderas att dricka lite vatten för att fukta tandköttet **innan** tabletten appliceras.

Hur Virono appliceras

	Innan tabletten sätts in, lokalisera området i överkäken ovanför den andra framtanden. Ta ut tabletten ur blistret. Tabletten kan appliceras på antingen höger eller vänster sida oavsett vilken sida de första tecknen eller symtomen på munsår uppträder.
	Detta läkemedel bör placeras på tandköttet i överkäken (inte på det faktiska området med munsår), precis ovanför den andra framtanden. Applicera tabletten omedelbart efter att du tagit ut den ur blisterförpackningen. Du kommer att se att tabletten har en rundad sida och en platt sida märkt med ”AL21”. Placera tabletten med den platta sidan på din torra fingertopp. Applicera tabletten med den rundade sidan mot tandköttet i överkäken. Läkemedlet kommer att fungera även om tabletten fastnar på insidan av läppen istället för på tandköttet.
	Håll tabletten på plats genom att trycka lätt med fingret på utsidan av överläppen i 30 sekunder för att försäkra dig om att tabletten fäster.

	När tabletten har applicerats stannar den på plats och löses gradvis upp under dagen.
---	--

Särskilda rekommendationer

Mat och dryck kan intas normalt då Virono är på plats. Sug eller tugga inte på tabletten, och svälj den inte.

Undvik alla situationer som kan störa tabletten vidhäftning:

- att röra vid eller trycka på en redan insatt tablett
- att tugga tuggummi
- att borsta tänderna under behandlingsdagen medan tabletten är på plats.

Om du av misstag sväljer en tablett av Virono:

- drick ett glas vatten
- om tabletten sväljs inom de första 6 timmarna efter applicering kan den ersättas en gång med en ny tablett.

Om Virono inte fäster, eller lossnar, inom de 6 första timmarna efter applikation:

- ska samma tablett omedelbart sättas in på nytt.
- om tabletten inte kan sättas in på nytt ska en ny tablett sättas in.

Om Virono lossnar eller sväljs av misstag efter 6 timmar ska tabletten inte ersättas.

Formen på tabletten kan ändras när den absorberar saliv så att den passar ihop med överkäkens form.

Du kan titta på användaranvisningar för Virono och specifika rekommendationer genom att skanna QR-koden som finns på ytterkartongen med en smartphone/mobil enhet. Samma information finns också på följande webbadress: www.virono.se.

Användning för barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Om du har använt för stor mängd av Virono

Du bör kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart, men risken för en överdos är låg på grund av det låga upptaget av aciklovir i blodet efter intag av Virono.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- Huvudvärk
- Smärta vid administreringsstället

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Yrsel
- Illamående
- Irritation vid administreringsstället
- Munsår (afte)
- Smärta i tandkött
- Rodnad

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Virono ska förvaras

- Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
- Förvaras vid högst 30 °C.
- Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
- Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**Innehållsdeklaration.**

- **Den aktiva substansen är** aciklovir. Varje häftande buckaltablett innehåller 50 mg aciklovir.
- **Övriga innehållsämnen är** hypromellos, mjölkproteinkoncentrat med spår av laktos, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

- Det här läkemedlet är en häftande buckaltablett på 8 mm, vit till svagt gul med en rundad sida och en platt sida märkt med ”AL21”.
- Varje Virono-kartong innehåller 1 eller 2 endosblister med 1 tablett i vardera.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Navamedic ASA

Postboks 2044 Vika

0125 Oslo

Norge

E-post: infono@navamedic.com

Tillverkare

Farméa
10 rue Bouché Thomas
ZAC d'Orgemont
49 000 Angers – Frankrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Frankrike: Virpax
Storbritannien (Nord-Irland), Tyskland: Sitavig
Spanien: Virmen
Portugal: Herpmed
Italien: HerpMed Labiale
Österrike: HerpesMed
Slovenien: Vopir
Rumänien, Ungern, Lettland, Litauen, Estland, Slovakien, Tjeckien, Kroatien: Bravilon
Bulgarien, Polen: Klivis
Belgien, Luxemburg: Vionox

Denna bipacksedel ändrades senast 2026-07-09