

Bipacksedel: Information till användaren

Voltaren 140 mg medicinskt plåster

diklofenaknatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Voltaren är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren
3. Hur du använder Voltaren
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Voltaren ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Voltaren är och vad det används för

Voltaren är ett smärtstillande läkemedel som hör till läkemedelsgruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID).

Voltaren medicinskt plåster används för lokal symtomatisk korttidsbehandling (max. 7 dagar) av smärta vid akuta sträckningar, stukningar eller blåmärken på armar och ben till följd av trubbiga skador hos vuxna och ungdomar från 16 år.

Diklofenaknatrium som finns i Voltaren 140 mg medicinskt plåster kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren

Använd inte Voltaren

- om du är **allergisk** mot **diklofenak** eller något **annat innehållsämne** i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är **allergisk** mot något annat **icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel** (NSAID t.ex. acetylsalicylsyra eller ibuprofen)
- om du har haft **astma, nässelutslag** eller **svullnad och irritation på näsans slemhinna** efter att ha använt acetylsalicylsyra eller annat läkemedel av NSAID-typ
- om du har aktivt **magsår eller tarmsår**
- på **skadad hud** (t.ex. skrubbsår, skärsår, brännskador), **infekterad hud eller hud påverkad av inflammation (exsudativ dermatit) eller eksem**
- under graviditetens sista tre månader
- om du är yngre än 16 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren:

- om du lider av eller tidigare har drabbats av astma eller allergier, du kan uppleva bronkialkramper (bronkospasm), vilket gör det svårt att andas.
- om du får **utslag** som utvecklas efter att det medicinska plåstrets har applicerats. Om detta händer, avlägsna omedelbart det medicinska plåstret och avsluta behandlingen.
- om du har **njur-, hjärt- eller leverproblem**, eller om du har eller har tidigare haft ett **magsår eller tarmsår, tarminflammation** eller har ökad **blödningsbenägenhet**.

Biverkningarna kan minskas genom att använda den lägsta effektiva dosen under kortast möjliga tid.

Viktiga försiktighetsåtgärder

- Det medicinska plåstret får inte komma i kontakt med eller appliceras på ögonen eller slemhinnorna.
- Äldre patienter ska använda Voltaren med försiktighet, eftersom de med större sannolikhet upplever biverkningar.

Undvik direkt solljus eller solarium på det behandlade området under behandlingen och minst två veckor efter avslutad behandling, för att minska risken för ljuskänslighetsreaktioner.

Använd inte Voltaren samtidigt som något annat läkemedel som innehåller diklofenak eller andra icke-steroida smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel, oavsett om dessa används utvärtes eller tas via munnen.

Barn och ungdomar

Voltaren medicinskt plåster skall inte användas till barn och ungdomar under 16 år. Det finns otillräckliga data om effekt och säkerhet för barn och ungdomar under 16 år (se avsnitt **Använd inte Voltaren**).

Andra läkemedel och Voltaren

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om Voltaren används korrekt, upptas endast en liten mängd diklofenak i kroppen. Interaktioner som förknippas med läkemedel som tas via munnen och som innehåller diklofenak är därför osannolika.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Gravida kvinnor ska inte använda Voltaren under de tre sista månaderna av graviditeten, eftersom en ökad risk för komplikationer för modern och barnet inte kan uteslutas (se "Använd inte Voltaren").

Om du planerar att skaffa barn eller under graviditetens sex första månader bör Voltaren endast användas efter att ha rådfrågat din läkare. Om du behöver behandling under den här perioden ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt.

Orala former (t.ex. tabletter) av diklofenak kan ha negativa effekter på ditt ofödda barn. Det är inte känt om samma risk gäller för Voltaren när det används på huden.

Amning

Små mängder diklofenak passerar över i modersmjölk. Tala med din läkare innan du använder Voltaren vid amning. Voltaren bör endast användas vid amning efter läkares ordination. Voltaren bör inte appliceras direkt på bröstområdet om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Voltaren påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.

Voltaren innehåller butylhydroxianisol (E320)

Butylhydroxianisol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller irritation i ögon och slemhinnor.

3. Hur du använder Voltaren

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är ett medicinskt plåster en gång dagligen.


Applicera ett medicinskt plåster på det smärtande området. Den högsta dygnsdosen är 1 medicinskt plåster dagligen, även om fler än ett skadat område behandlas. Behandla endast ett smärtande område åt gången.

Hur plåstret ska användas

För användning på huden (kutan användning).


Bruksanvisning:

1. Klipp upp påsen längs den streckade linjen och ta ut det medicinska plåstret.




Applicering av plåstret:

2. Avlägsna en av de två skyddsfilmerna.



3. Applicera plåstret på området som ska behandlas och avlägsna den återstående skyddsfilmen.



4. Tryck försiktigt med handflatan tills plåstret har fäst ordentligt på huden.



Avlägsnande av plåstret:

5. Fukta plåstret med vatten och ta tag i ena kanten och dra försiktigt av plåstret från huden.

6. För att avlägsna eventuella rester av produkten, tvätta det behandlade området försiktigt med vatten och gnid området med cirkelformade fingerrörelser.

Vid behov kan det medicinska plåstret fästas med ett nätförband.

Det medicinska plåstret får endast användas på hel och frisk hud.

Det medicinska plåstret får inte användas tillsammans med lufttäta ocklusionsförband.

Plåstret får inte användas när du badar eller duschar.

Det medicinska plåstret får inte delas.

Behandlingstid

Använd inte Voltaren medicinskt plåster i mer än 7 dagar. Om detta läkemedel behövs i mer än 7 dagar för smärtlindring, eller om du mår sämre, ska du uppsöka en läkare.

Om du har använt för stor mängd av Voltaren

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om du eller t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tala om för din läkare om allvarliga biverkningar uppstår efter felaktig användning av detta läkemedel eller vid oavsiktlig överdosering (t.ex. hos barn). Läkaren kan ge råd om eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Om du har glömt att använda Voltaren

Använd inte dubbla plåster för att kompensera för glömt plåster.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakta genast läkare och sluta använda plåstret om du märker något av följande:

plötsligt, kliade utslag (nässelutslag); svullnad av händer, fötter, vrist, ansikte, läppar, mun eller svalg; andningssvårigheter; lågt blodtryck eller svaghet.

Följande biverkningar kan förekomma:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

lokala hudreaktioner, t.ex. hudrodnad, brännande känsla, klåda, hudinflammation med rodnad, utslag, ibland med varblåsor eller upphöjningar.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

överkänslighetsreaktioner eller lokala allergiska reaktioner (kontakteksem).

Hos patienter som använt utvärtes läkemedel som hör till samma läkemedelsgrupp som diklofenak, har enstaka rapporter om följande förekomst: utslag på hela kroppen, överkänslighetsreaktioner såsom svullnad av huden och slemhinnorna och reaktioner av anafylaktisk typ med akuta blodcirkulationsstörningar och ljuskänslighetsreaktioner.

Diklofenak absorberas in i kroppen genom huden i mycket liten grad jämfört med läkemedelskoncentrationen i blodet efter intag av diklofenak genom munnen. Därför är risken för biverkningar som påverkar hela kroppen (såsom störningar i magtarmkanalen, njurarna eller andningssvårigheter) mycket låg.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via: Läkemedelsverket, Box 26. 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Voltaren ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på den yttre förpackningen och dospåsen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Använd inte Voltaren om plåstret är skadat.

Använda plåster ska vikas på mitten med den häftande sidan inåt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är diklofenaknatrium.
Varje medicinskt plåster innehåller 140 mg diklofenaknatrium.
- Övriga innehållsämnen är:
Stödlager:
Fiberduk av polyester
Självhäftande lager:
Polyakrylatdispersion
Tributylcitrat
Butylhydroxianisol (E 320)
Skyddspapper:
Papper med monosilikonbeläggning

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Voltaren är ett vitt självhäftande plåster i storleken 10x14 cm. Den ena sidan är tillverkad av fibertyg av polyester och den andra sidan av papper. När skyddspappret har avlägsnats är den självhäftande filmen genomskinligt blank.

Voltaren finns i förpackningar på 2, 5, 7 och 10 medicinska plåster i endospåsar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark

E-mail: mystory.nd@haleon.com

Tillverkare

Fidia farmaceutici S.p.A.
Via Ampere, 29
20037 Paderno Dugnano (MI)
Italien

eller

Haleon Germany GmbH
Barthstraße 4

80339 München
Tyskland

Detta läkemedel är godkänt i EES-länderna under följande namn:

Österrike:	Voltadol 24 Stunden Schmerzpfaster 140 mg wirkstoffhaltiges Pflaster
Belgien:	Voltaren Patch Once Daily, 140 mg pleister / emplâtre médicamenteux / Wirkstoffhaltiges Pflaster.
Bulgarien:	Волтарен 140 mg лечебен пластир.
Tjeckien:	Voltaren 1x denně.
Estland:	Voltinex.
Frankrike:	Voltarenactigo 140 mg, emplâtre médicamenteux.
Tyskland:	Voltaren 24 Stunden Schmerzpfaster 140 mg wirkstoffhaltiges Pflaster.
Grekland:	VOLTADOL 24-HOURS.
Ungern:	Voltaren 140 mg gyógyszeres tapasz
Italien:	Voltadol Unidie 140 mg cerotto medicato
Lettland:	Voltinex 140 mg ārstnieciskais plāksteris
Litauen:	Voltinex 140 mg vaistinis pleistras
Luxemburg:	Voltaren Patch Once Daily, 140 mg emplâtre médicamenteux / Wirkstoffhaltiges Pflaster.
Nederländerna:	Voltaren Pleister 140 mg
Polen:	Voltaren Forte.
Portugal:	Voltaren 24h, 140 mg, emplastro medicamentoso.
Rumänien:	Voltaren 140 mg emplastru medicamentos.
Spanien:	Voltadol 140 mg apósito adhesivo medicamentoso.
Slovakien:	Voltaren 1x denne 140 mg liečivá náplast'.

Denna bipacksedel ändrades senast 2026-09-09