

Bipacksedeln: Information till användaren

Xyd 40 mg/g kutan spray, gel diklofenaknatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel finns både receptfritt och receptbelagt.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om detta läkemedel införskaffats receptfritt, måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.
- Om detta läkemedel har ordinerats åt dig, ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Xyd kutan spray är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xyd kutan spray
3. Hur du använder Xyd kutan spray
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xyd kutan spray ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xyd kutan spray är och vad det används för

Det aktiva innehållsämnet, diklofenaknatrium, tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

Xyd kutan spray används vid mild till måttlig smärta i samband med muskel- och ledsador.

Xyd kutan spray är en lösning som får en gelliknande konsistens när den sprayas på huden. Sprayen är endast avsedd för utvärtes bruk.

Diklofenaknatrium som finns i Xyd kutan spray kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Xyd kutan spray

Använd inte Xyd kutan spray

- om du är allergisk mot diklofenaknatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har haft en allergisk reaktion mot acetylsalicylsyra eller mot något annat antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). Symtom på en allergisk reaktion kan vara svårigheter att andas, hudutslag eller rinnsnuva.
- under graviditetens sista tre månader.
- om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet.

Xyd kutan spray skall inte användas av barn och ungdomar under 14 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Xyd kutan spray

- om du har eller har haft magsår, eller har nedsatt hjärt-, lever- eller njurfunktion.
- om du tidigare har haft astma eller allergisk sjukdom.
- undvik att få spray i ögonen, munnen eller på andra slemhinnor. Svälj aldrig läkemedlet. Om du av misstag skulle få spray i ögonen, skölj rikligt med vatten och kontakta läkare.
- undvik direkt sol och solarium, t.ex. genom att täcka det behandlade området med kläder, under behandlingen och minst två veckor därefter.
- avbryt behandlingen om du får hudutslag.

Risken för biverkningar ökar med tiden. Använd därför inte sprayen längre än den rekommenderade behandlingstiden.

Använd inte sprayen tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas, men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

Behandling med Xyd kutan spray skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.

Om detta läkemedel och ett annat NSAID används samtidigt, kan risken för biverkningar öka.

Om du är osäker på något, rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Andra läkemedel och Xyd kutan spray

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Använd inte Xyd kutan spray om du är i de sista tre månaderna av graviditeten. Du ska inte använda Xyd kutan spray under graviditetens sex första månader om det inte är absolut nödvändigt och sker på din läkares inrådan. Om du behöver behandling under den här perioden ska du använda den lägsta möjliga dosen under så kort tid som möjligt. Orala former (t.ex. tabletter) av Xyd kutan spray kan ha negativa effekter på ditt ofödda barn. Det är inte känt om samma risk gäller för Xyd kutan spray när det används på huden.

Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Xyd kutan spray skall inte användas under graviditetens sista tre månader.

Det är inte känt om diklofenak går över i modersmjölk. Rådgör alltid med läkare före behandling med Xyd kutan spray. Sprayen får inte appliceras på bröstet hos ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Xyd kutan spray påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Xyd kutan spray innehåller propylenglykol, pepparmyntolja och vattenfri etanol.

Xyd kutan spray innehåller pepparmyntolja som kan orsaka allergiska reaktioner.

Detta läkemedel innehåller 150 mg propylenglykol per gram. Propylenglykol kan ge hudirritation.

Detta läkemedel innehåller 33,3 mg alkohol (etanol) per gram (3,3 % w/w). Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

3. Hur du använder Xyd kutan spray

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Dosen bestäms av läkare, som anpassar den individuellt för dig.

Dosen och behandlingstidens längd bestäms beroende på smärttillstånd.

Har detta läkemedel inte ordinerats åt dig, använd Xyd kutan spray enligt anvisningarna nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och ungdomar över 14 år:

- Vanlig dosering är 4-5 sprayningar 3 gånger dagligen på det smärtande eller svullna området. Högst 15 sprayningar per dag.
- Sprayen får en gelliknande konsistens när den kommer på huden. Massera försiktigt in gelen i huden. Tvätta händerna efteråt om det inte är händerna som behandlas.
- Vänta tills gelen har torkat innan du sätter på kläder eller bandage.
- Om ingen förbättring av symtomen skett efter 7 dagars behandling, kontakta läkare.
- Avsluta behandlingen när symtomen (smärta och svullnad) har gått tillbaka. Behandlingstiden bör inte överskrida 14 dagar för vuxna eller 7 dagar för ungdomar över 14 år utan läkarordination.

Om du har använt för stor mängd av Xyd kutan spray

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Xyd kutan spray

Använd sprayen så snart du kommer ihåg det, men ta inte dubbla doser för att kompensera den dos du glömt. Fortsätt sedan doseringen som tidigare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna är oftast lindriga och övergående hudreaktioner på behandlingsstället. I enstaka fall kan allergiska reaktioner förekomma.

Sluta använda Xyd kutan spray och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Hudutslag, klåda, hudrodnad, svullnad och blåsbildning i huden där gelen appliceras. Allergiska hudreaktioner, andningssvårigheter. Angioödem (svullnad av hud och slemhinnor, t.ex. i ansikte och fingerleder). Myrkrypningar och ofrivilliga muskelrörelser. Känslighet för solljus.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Xyd kutan spray ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad förpackning ska användas inom 6 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är diklofenaknatrium. 1 gram kutan spray innehåller 40 mg diklofenaknatrium.
- Övriga innehållsämnen är isopropylalkohol, sojalecitin, vattenfri etanol, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumedetat, propylenglykol, pepparmyntolja, askorbylpalmitat, saltsyra, natriumhydroxid och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xyd kutan spray gel är en gyllengul, genomskinlig lösning som får en gelliknande konsistens när den sprayas på huden.

Förpackningsstorlekarna 12,5 g och 25 g är receptfria och 2x25 g är receptbelagd.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Giuliani Spa, Via Palagi 2, 20129 Milano, Italien

Tillverkare

Pharbil Waltrop GmbH, 45731 Waltrop, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast:

2026-09-01