

Bipacksedel: Information till användaren

Zyx mint 3 mg sugtablett

benzydaminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Zyx mint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zyx mint
3. Hur du tar Zyx mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zyx mint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zyx mint är och vad det används för

Zyx mint innehåller den aktiva substansen benzydamin som tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och används för lokal behandling i munhålan.

Zyx mint används för att lindra smärta och irritation i mun och svalg hos vuxna och barn över 6 år.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar.

Benzydaminhydroklorid som finns i Zyx mint kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du tar Zyx mint

Ta inte Zyx mint

- om du är allergisk mot benzydaminhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zyx mint:

- om du lider av fenylketonuri, eftersom Zyx mint innehåller en fenylalaninkälla (sötningsmedlet aspartam).
- om du har eller har haft astma, eftersom Zyx mint då kan ge upphov till kramper i luftrören.
- om du är allergisk mot andra antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID) såsom acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen eller naproxen.
- om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.

- I sällsynta fall kan sårbildning i mun/svalg vara tecken på en allvarlig sjukdom. Om smärtan i halsen eller svalget försämras eller inte förbättras inom 3 dagar när du använder sugtablettarna, eller om du får feber eller andra symtom, bör du därför uppsöka läkare eller tandläkare.

Andra läkemedel och Zyx mint

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Zyx mint med mat och dryck

Mat och dryck har ingen påverkan.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel.

Du ska inte använda Zyx under graviditet om det inte är absolut nödvändigt och om det inte rekommenderas av din läkare. Om du behöver behandling ska du använda den lägsta dosen under kortast möjliga tid.

Zyx mint sugtabletter ska inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Zyx mint påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zyx mint innehåller:

- **Isomalt:** Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.
- **Aspartam:** Detta läkemedel innehåller 3,5 mg aspartam per sugtablett motsvarande 3,5 mg/3202 mg. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt om du har fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.
- **Mintarom som innehåller bensylalkohol, citronellol, d-limonen, eugenol, geraniol och linalol samt citronarom som innehåller bensylalkohol, citral, citronellol, d-limonen, geraniol och linalol.** Dessa ämnen kan ge allergiska reaktioner.
- **Butylhydroxianisol (E 320) som är ett innehållsämne i citronaromen:** Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

3. Hur du tar Zyx mint

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos:

Vuxna och barn över 6 år: 1 sugtablett 3 gånger dagligen. Ta inte mer än 3 sugtabletter per dygn.

Användning för barn

Barn i åldern 6-11 år: När barn under tolv år tar Zyx mint sugtabletter bör en vuxen kontrollera att de tas korrekt.

Sugtabletter ska inte ges till barn under sex år.

Zyx mint ska inte användas i mer än 7 dagar. Om förbättring av symtomen inte skett efter 3 dagars behandling bör läkare eller tandläkare kontaktas.

För användning i munnen och svalget. Låt en sugtablett smälta långsamt i munnen.

Sugtabletterna ska inte sväljas hela eller tuggas.

Om du har tagit för stor mängd av Zyx mint

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Det finns mycket sällsynta rapporter om barn som blivit uppjagade/oroliga eller drabbats av kramper, svettning, ofrivilliga muskelrörelser, darningar och kräkningar efter intag av benzydamindoser ca 100 gånger högre än styrkan hos sugtabletterna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Zyx mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Ljuskänslighet (utslag eller solskada).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

- Brännande känsla i munnen eller muntorrhet (om detta händer, drick lite vatten för att lindra effekten)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- Plötslig svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor (angioödem).
- Kramp i struphuvudet (laryngospasm).

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

- Känsla av domningar i munnen (oral hypoestesi).
- Allergisk reaktion (överkänslighet).
- Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk chock), med tecken såsom andningssvårigheter, bröstsmärta eller trånghets känsla i bröstet och/eller yrsel/svimmelhet, svår klåda eller upphöjda utslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg. Detta kan vara livshotande.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

5. Hur Zyx mint ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvaras vid högst 25°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är benzydamin.
- En sugtablett innehåller 3 mg benzydaminhydroklorid motsvarande 2,68 mg benzydamin.
- Övriga innehållsämnen är isomalt (E 953), aspartam (E 951), levomentol, citronsyra-monohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zyx mint sugtabletter är gröna, fyrkantiga med en fördjupning i mitten.

Sugtablettarna förpackas i PVC/PE/PVDC-ALU blister eller inslagna i paraffinerat papper.

Varje förpackning innehåller 20 eller 30 sugtabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Cooper Consumer Health B.V.

Verrijn Stuartweg 60,

1112AX Diemen

Nederländerna

Tillverkare:

ACRAF SpA

Via Vecchia del Pinocchio, 22

60131 Ancona, Italien

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

Site Diététique et Pharmacie

Zone Industrielle de la Coudette

32290 Aignan, Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast: 2026-04-14